N° 2. — 1848.

# CATALOGUE GÉNÉRAL

## DES VÉGÉTAUX DE SERRE CHAUDE, TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE,

**Disponibles pour l'automne 1848 et le printemps 1849**

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

**D'AUG.-NAPOLÉON BAUMANN,**

**Successeur d'Aug. et Nap. BAUMANN, horticulteur, membre de plusieurs sociétés horticoles et agricoles, étrangères et françaises.**

A BOLLWILLER,

**Poste restante à Soultz (Haut-Rhin, France).**



**MULHOUSE,**

IMPRIMERIE DE P. BARET, PLACE DE LA BOURSE, 2.

—


1848.

## CONDITIONS.

MM. les amateurs sont priés de m'indiquer exactement leurs adresses et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose **à trois mois du montant de mes factures dépassant 100 fr.;** pour celles au-dessous, j'en fais **suivre l'importance en remboursement.**

Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées **de joindre à leur commande un mandat d'égale valeur** sur **Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort s/M., Bâle,** ou **Augsbourg, faute de quoi je ferais suivre le remboursement.**

L'emballage se paye séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

## BEDINGUNGEN.

Die verehrten Liebhaber sind gebeten **ihre Adresse und die Bestimmung, wie auch die Versendungsweise genau anzugeben.**

**Den Betrag** meiner **Facturen die sich über 100 Fr. belaufen, entnehme ich auf 3 Monat. Mindere Summen** nehme ich auf den **Sendungen nach.** Abnehmer mit denen ich in Rechnung stehe, machen natürlich Ausnahme; Liebhaber mit denen ich noch nicht die Ehre habe in Verbindung zu stehen, sind gebeten **ihren Bestellungen ein Mandat auf Paris, Strassburg, Basel, Mülhausen, Frankfort a/M, oder Augsburg**, beizufügen; widrigenfalls wird der Betrag ohne Rücksicht der Summe nachgenommen.

Die Emballage wird besonders, jedoch so billig als mœglich berechnet, und meistens mit unentgeldlichen Zulagen von Pflanzen ersetzt.

# PLANTES DE SERRE CHAUDE.

## OBSERVATIONS.

*Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre, sont les mois d'Avril, Mai, Septembre et Octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.*

*Il peut arriver, à la suite de fortes demandes, que je manque momentanément de quelques plantes portées sur mon catalogue; je prie messieurs les commettans de m'autoriser à les remplacer par des nouveautés analogues, ou de m'indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.*

*J'apporterai les soins les plus scrupuleux au bon conditionnement de mes envois,* QUI VOYAGERONT AUX RISQUES ET PÉRILS DES DEMANDEURS.

*A la réception de plantes de serre restées en route pendant quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer le pot dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord à l'air, et ensuite au soleil. De cette façon, on parviendra facilement à les conserver, en ménageant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.*

| *La pièce.* | fr. c. |
|---|---|
| **Abutilon** pœoniæflora | 1 » |
| venosum | 1 à 2 » |
| **ACHIMENES** alba. *Niphæa oblongata* | » 50 |
| argyrostygma | » 50 |
| Bradini | » 50 |
| 100 bulbes | 10 » |
| coccinea (Pers.). *Trevirana coccinea* | » 50 |
| 100 bulbes | 5 » |
| rosea | » 50 |
| **Escheriæna** (R.), *magnifique variété à très-grandes fleurs d'un violet amaranthe* | 5 » |
| grandiflora (DC.). *A. Ghiesbrechti* | » 50 |
| le 100 bubilles | 8 » |
| hirsuta | 1 » |
| ignea | » 50 |
| illicifolia | » 50 |
| 100 bulbes | 10 » |
| Liebmanni | 1 » |
| longiflora (DC.) | 50 c. à 1 f. |
| multiflora | » 50 |
| patens | 1 » |
| pedunculata | » 50 |
| picta | » 50 |
| **Smaragtina** (Regel) | 5 » |
| tubiflora | » 50 |
| le 100 bubilles | 5 » |
| **ACHMEA** discolor | 5 à 10 » |
| fulgens | 5 à 10 » |
| **Agave** fœtida, *forte plante* | 6 » |
| **Alpinia** malabarica | 3 » |
| nutans (Bot. Mag.). *Renealmia nutans* (And.) | 2 » |
| spiralis (Jacq.) | 2 » |
| **Alyxia** Richardsoni (Bot. Reg.) | 1 à 2 » |
| **Amaryllis.** *Voyez le catalogue des oignons et fleurs.* | |
| **Aralia** arborea (Lin.) | 2 à 4 » |
| umbellifera (Lam.) | 2 » |
| **Ardisia** colorata (Link.) | 1 à 5 » |
| complanata Flor. ind. | 2 » |

| *La pièce.* | fr. c. |
|---|---|
| **Ardisia** crenulata | 50 c. à 2 f. |
| 6 *jeunes plantes de* 10 *centim.* | 3 » |
| hymenandra (Wall.) | 3 à 8 » |
| humilis | 2 » |
| **Arystea** cyanea (Ait.) | 1 » |
| **Arthrostemma** parietarium. *Centradenia rosea.* | » 50 |
| **Arum** bicolor | 1 » |
| Colocasia (C.). Colocasia antiquorum. | 1 à 20 » |
| cordifolium | 1 à 2 » |
| indicum | 10 » |
| Mafaffa | 5 » |
| sagittæfolium | 1 » |
| **ASPIDISTRA** elatior fol. var. | 1 50 |
| **Astrapaea** Wallichii (Ker.) | 1 à 10 » |
| **Bambusa** arundinacea (Retz) | 2 » |
| **Banisteria** argentea. *Heteropteris argentea.* | 5 » |
| laurifolia (Lin.) | 2 » |
| **Barbacenia** purpurea (Hook.) | 2 » |
| **Baumannia** geminiflora (DC.) | 1 » |
| **Beaumontia** grandiflora (Bot. Reg.) | 2 » |
| **Begonia** argyrostigma (Bot. Reg.), *maculata* (Red.) | 1 » |
| canaliculata | 1 » |
| coccinea | 1 » |
| discolor (Smith.) | 1 » |
| Dregei (H. Berol.) | 1 » |
| grandis (Dryand.) | 1 » |
| hybrida | 1 » |
| hydrocotylefolia | 1 » |
| macrophylla (Dryand.) | 1 50 |
| manicata | 1 » |
| Moehringi (Rgl.) | 2 à 3 » |
| *Une magnifique espèce développant ses belles fleurs roses pendant tout l'hiver.* | |
| muricata | 1 » |
| nitida discolor | 1 » |
| Noacki | 1 » |
| papillosa (Grah.) | 1 » |

| *La pièce.* | fr. c. |
|---|---|
| **Begonia** peltata . . . . . . . . . | 1 » |
| peponæfolia . . . . . . . . . . | 2 » |
| punctata (H.). *B. maculata* . . . . | 1 » |
| semperflorens (Lk. et Otto). . . . . | » 50 |
| sinuata (Wall.) . . . . . . . . . . | 1 50 |
| Species du Brésil. *B. coccinea?* . . | 2 » |
| ulmifolia. . . . . . . . . . . . | » 50 |
| vitifolia . . . . . . . . . . . . | 1 » |
| Warsowizki, hybride du *B. manicata* | » o0 |
| **Billbergia** clavata (Lin.). . . . . . | 1 à 3 » |
| intermedia . . . . . . . . . . . | 1 50 |
| iridifolia (Lindl.). . . . . . . . . | 2 » |
| pyramidalis (Lind.). . . . . . . . | 1 50 |
| zebrina . . . . . . . . . . . . | 4 » |
| **Bonapartea** elegans (Hort.). *Roulinia* | |
| *Brong* . . . . . . . . . . . | 5 » |
| *Un magnifique exemplaire* . . . | 30 » |
| juncea (R. P.). . . . . . . . . . | 3 » |
| filamentosa . . . . . . . . . . | 4 » |
| **Boophona** ciliaris (Herb.) . . . . . | 4 » |
| **Brexia** madagascariensis (H. Kew.). . | 3 » |
| serrata (Presl.) . . . . . . . . . | 3 » |
| **Bromelia. Ananas.** | |
| Ananas (Linn.) . . . . . . . . . | 1 50 à 6 |
| à feuilles panachées. . . . . . . | 6 à 10 » |
| à feuilles lisses, *recommandable par la qualité de son fruit.* . . . . | 4 à 10 » |
| Antigoa black. . . . . . . . . . | » » |
| bracteata. . . . . . . . . . . . | 2 à 8 » |
| Enville . . . . . . . . . . . . | 10 » |
| globe, *gros fruit* . . . . . . . | 3 à 6 » |
| hémisphérique, *gros fruit*. . . . . | 3 à 6 » |
| Karatas . . . . . . . . . . . . | 3 » |
| macrocarpa. . . . . . . . . . . | 6 » |
| nervosa . . . . . . . . . . . . | 6 » |
| **Ananas de la Martinique** ou **commun** . . . . . . . . | » » |
| *Plantes d'une année, les* 12. . . . . | 35 » |
| » *de* 2 *années*, » . . . . . | 56 » |
| » *de* 3 *années, pour fruits, les* 12. | 70 » |
| **Brugmansia** arborea non. B. candida | 1 » |
| floribunda . . . . . . . . . . . | 1 » |
| Knightii. . . . . . . . . . . . | 1 » |
| **Brunfelsia** americana (Lin.) . . . . | 2 » |
| violacea . . . . . . . . . . . . | 1 » |
| **Caladium** odoratum (Roxb.) . . . . | 2 à 4 » |
| **Calostemma** Cunninghami (Ait.) . . | 5 » |
| **Canna** gigantea . . . . . . . . . | 1 50 |
| grandis . . . . . . . . . . . . | 2 » |
| Lambertii? . . . . . . . . . . . | 1 50 |
| leptochila (Bouché). . . . . . . . | 1 50 |
| longifolia glauca du Brésil . . . . | 3 » |
| patens (Rose) . . . . . . . . . . | 1 50 |
| spectabilis . . . . . . . . . . . | 2 » |
| **Carolinea** alba . . . . . . . . . | 5 » |
| insiguis (Hort.) . . . . . . . . . | 8 » |
| **Cecropia** peltata (Lin.) . . . . . . | 3 » |
| **Cerbera** Thevetia (Lin.). . . . . . | 2 » |
| **Ceropegia** stapeliæformis (Haw.) . . | 1 » |
| **Chamberlayna** spectabilis. . . . . | 2 à 3 » |

| *La pièce.* | fr. c. |
|---|---|
| **Chirita** sinenses (Fl. de Van Houtti) . | 1 » |
| zeilanica. . . . . . . . . . . . | 2 à 3 » |
| **Cinnamomum.** — *Voyez* **Laurus.** | |
| **Clavia** ornata (Don.) . . . . . . . | 10 » |
| **Clivea** nobilis (Lind.) . . . . . . . | 1 à 15 » |
| **Clerodendron** speciosum . . . . . | 2 » |
| fragrans (Willd.). Valkameria japonica (Th.) . . . . . . . . . . | 1 à 2 » |
| flore pleno. . . . . . . . . . | 1 à 2 » |
| hastatum (Wall.) . . . . . . . . | 1 50 |
| papilio- . . . . . . . . . . . . | 2 » |
| speciosissimum . . . . . . . . . | 1 50 à 3 |
| splendens (Knight.). . . . . . . . | 2 » |
| flore albo . . . . . . . . . . | 2 » |
| squamatum verum . . . . . . . . | 3 » |
| **Coburgia** flava? . . . . . . . . | 4 » |
| fulva (Herbert.) . . . . . . . . . | 2 » |
| **Coccoloba** barbadensis . . . . . . | 5 » |
| laurifolia. . . . . . . . . . . . | 8 » |
| pubescens . . . . . . . . . . . | 10 à 20 |
| Rheifolia (Desf.). *C. latifolia*. . . . | 10 » |
| **Coffea** arabica (L.) . . . . . . . . | 2 à 10 » |
| Moriziana . . . . . . . . . . . | 3 » |
| species de la Havane . . . . . . . | 5 » |
| **Columnea** crassifolia . . . . . . . | 2 » |
| grandiflora . . . . . . . . . . . | 1 50 |
| longifolia (L.). *C. Lindleyana* . . . | » 50 |
| zebrina . . . . . . . . . . . . | 2 » |
| **Crinum.** *Voyez le Catalogue des oignons et bulbes.* | |
| **Curculigo** recurvata (Dryand.) . . . | 1 à 5 » |
| **Cyrtanthus** spiralis (Brach.) . . . . | 2 » |
| **Desmodium** alatum (DC.) . . . . . | 1 50 |
| gyroides (DC.) . . . . . . . . . | 2 » |
| species du Madagascar . . . . . . | 4 » |
| **Dianella** cœrulea (Smith.) . . . . . | » 75 |
| divaricata (R. B.) . . . . . . . . | 1 50 |
| **Dichorisandra** ovata (Mart.) . . . . | 1 à 2 » |
| **DIONÆA** muscipula (L.). . . . . . | 1 50 à 3 |
| 6 *jeunes plantes, avec indication de culture*. . . . . . . . . . | 6 » |
| **Diplatenia** atropurpurea. . . . . . | 3 » |
| **Dombeya** Erythroxylon. . . . . . | 3 » |
| **Dracæna** amaryllifolia? . . . . . . | 10 » |
| arborea (Link.) . . . . . . . . . | 5 » |
| australis (Forst.). . . . . . . . . | 4 » |
| *Une forte plante*. . . . . . . . | 10 » |
| brasiliensis (Hort.). . . . . . . . | 4 » |
| Draco (Willd.) . . . . . . . . . | 3 » |
| *Une forte plante*. . . . . . . . | 15 » |
| *Un exemplaire avec un tronc de* 1m,65 *de hauteur* . . . . . | 40 » |
| cernua (Jacq.). . . . . . . . . . | 5 » |
| ensifolia (Haw.) . . . . . . . . . | 3 à 6 » |
| nigra . . . . . . . . . . . . . | 10 » |
| paniculata ? an. nova species . . . . | 4 » |
| reflexa (Lmk.). . . . . . . . . . | 3 » |
| salicifolia. . . . . . . . . . . . | 4 » |
| terminalis (L.) . . . . . . . . . | 2 à 5 » |
| foliis variegatis . . . . . . . . | 2 à 10 » |

| La pièce. | fr. c |
|---|---|
| **Dracœna** undulata? | 5 » |
| **Dyckia** rariflora (Scult.) | 2 » |
| remotiflora (Otto) | 1 à 3 » |
| **Erythrina** caffra (Bot. Reg.) | 3 » |
| arborea (Sacq.) | 2 » |
| crista galli | 1 à 5 » |
| laurifolia | 2 » |
| herbacea (L.) | 4 » |
| picta (Lin.) | 5 » |
| speciosa (Andr.) | 3 à 6 » |
| species du Mexique, *à belles feuilles d'un vert foncé* | 10 » |
| **Euphorbia** Jacquiniflora (H.). *Euph. fulgens* (Karv.) | 1 » |
| Breoni (Hortul.) | 1 » |
| canariensis (L.) | 2 » |
| Caput Medusæ (L.) | 1 » |
| eliptica | 1 » |
| globosa (Sims.) | 1 50 |
| lophogona (Lam.) | 2 » |
| neriifolia (Linn.) | 1 50 |
| pulcherrima (Willd.). *Poinsettia pulcherrima* | 1 » |
| splendens (Bojer) | 1 à 3 » |
| **Ficus** australis (Willd.) | 1 50 |
| elastica (Roxb.) | 1 à 10 » |
| laurifolia | 3 » |
| oppositifoifa (Roxb.) | 1 50 |
| repens (Roxb.) | » 50 |
| species du Brésil, *à feuilles luisantes d'un vert clair, belle plante* | 5 » |
| **FOURCROYA** longæva (Karw.), *fort.* | 50 » |
| **Franciscea** hydrangiæformis | 3 à 4 » |
| latifolia | 2 à 4 » |
| Pohliana | 1 50 |
| uniflora | 1 à 3 » |
| 6 *plantes florifères* | 4 » |
| **Galactodendron** speciosum? | 3 » |
| utile (H. B.), *vera* | 10 » |
| **Gardenia** florida (L.) | 1 à 3 » |
| flore pleno | 1 à 3 » |
| latifolia (Ait.) | 3 à 6 » |
| lucida (Roxb.) | 1 à 4 » |
| radicans (Thunb.) | 1 à 3 » |
| *Greffé en tige sur* G. Florida | 2 » |
| Scherbourniana | 4 » |
| tetrasperma (Roxb.) | 1 » |
| **GASTONIA** palmata (Roxb.). *Gilibertia palmata* | 10 à 30 |
| **Gessneria** aggregata (Ker.) | 2 » |
| bulbosa (Ker.) | 1 50 |
| Douglasii | 2 » |
| elongata (H. B.) | 1 50 |
| faucialis (Lindl.) | 2 » |
| Geroldtiana | 1 » |
| grandis (Sw.) | 2 » |
| Huttei nova | 2 » |
| pendulina. *G. aggregata* | 2 » |
| sceptrum | 4 » |
| Schotti (Mikan.) | 1 50 |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Gessneria** species du Brésil | 8 » |
| tomentosa (Spr.) | 3 » |
| Zebrina | 1 à 3 » |
| **Globa** erecta (Red.) | 2 » |
| **Gloxinia** caulescens | 1 » |
| maculata (l'Hérit.) | 1 » |
| maxima | 1 » |
| pallida | 1 » |
| Cer'na | 1 50 |
| digitaliflora | 2 » |
| formosa | 1 » |
| gesnerioides | 2 » |
| Goodii | 3 » |
| hirsuta | 1 à 3 » |
| insignis rubra | 3 » |
| Menziesi | 1 à 2 » |
| Muziana | 3 » |
| obscura | 1 » |
| Priestleyana | 1 » |
| prœcellentissima | 1 à 2 » |
| rosea | 1 50 |
| rubra | 1 » |
| **rubra speciosissima**, nouveau gain superbe | 3 » |
| speciosa (Lod.) | » 50 |
| flore albo. *G. candida* | 2 » |
| **GUZMANNIA** tricolor (R. P.) | 4 à 10 » |
| **Habrothamnus** elegans | 1 50 |
| cyaneus | 1 » |
| fasciculatus | 1 » |
| **Hæmanthus.** *(Voyez le Catalogue des oignons et fleurs.)* | |
| **Harrachia** speciosa (Jacq.) | 2 » |
| **Hedychium** angustifolium (Roxb.) | 2 » |
| coronarium (Kœn.) | 1 50 |
| Gardnerianum (Wall.) | 2 » |
| **Heliconia** Bihai (Willd.) | 2 » |
| speciosa | 2 » |
| **Heliotropium** grandiflorum (Schr.) | 1 » |
| arborescens | 1 50 |
| Voltairianum | 1 » |
| **Hibiscus** Cameronis | 1 » |
| rosa sinensis (L.) | 1 50 |
| cupreo plena | 1 50 |
| luteo pleno | 1 50 |
| purpureo pleno | 1 50 |
| pedunculatus (Thunb.) | 2 » |
| **Inga** pulcherrima | 2 » |
| species? | 8 » |
| **JACARANDA** filicifolia | 3 » |
| **Jasminum** Azoricum | 1 à 3 » |
| grandiflorum | 1 à 3 » |
| Sambac (Ait.), flore pleno | 1 50 |
| Grand duc de Toscane | 8 » |
| multiflorum | 1 » |
| **Justicia** carnea superba. *J. velutina* | 1 50 |
| cristata (Jacq.) | 2 » |
| oblongata (Link.) | 2 » |
| sinensis | 1 » |
| speciosa | 2 à 4 » |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Kæmpfera** elegans. *Monolophus elegans* | 2 » |
| longa (Jacq.) | 1 à 2 » |
| ovata | 2 » |
| **Kookia** punctata | 4 à 6 » |
| **Lantana** Selloi (Link.) | » 50 |
| **Laurus** Cinnamomnm | 3 à 5 » |
| involucrata | 1 50 |
| Persea (Wld.). Persea gratissima (Gært.) | 20 » |
| **Limonia** spectabilis | 10 à 20 |
| trifoliata (L.) | 1 50 |
| **Lobelia** surinamensis. *Centropogon surinamensis* | 2 » |
| **LUCULIA** gratissima (Sweet.) | 3 à 8 » |
| pinceana | 5 à 10 » |
| **Magnolia** fuscata (Andr.) | 1 50 à 6 |
| pumila | 2 à 4 » |
| **Malva** umbellata (Cav.) | 1 » |
| **Manettia** cordifolia (Mart.) | 1 » |
| **Maranta** capitata (R. et B.) | 1 50 |
| grandis | 2 » |
| zebrina (Spr.). Calathea zebrina (B. R.) | 2 à 5 » |
| **Marica** cœlestis (Lehm.) | 1 » |
| Northiana | 1 50 |
| **Melastoma** cœruleum | 2 » |
| macrocarpum | 3 » |
| macrophyllum | 2 » |
| sanguineum | 3 » |
| Selloi | 1 » |
| **Mimosa** quadrangularis | 2 » |
| pudica (Linn.) | 1 » |
| **Murraya** exotica (Linn.) | 1 50 |
| **Musa** rosacea (Jacq.) | 3 à 6 » |
| Cavendishii (Paxt.) | 2 à 10 » |
| coccinea (Andr.) | 6 » |
| indica rosacea nova | 5 » |
| speciosa (Tenor.) | 4 à 10 » |
| Zebrina | 10 à 20 |
| **Musanda** macrophylla | 3 » |
| **Myrtus** pimenta (Linn.) | 2 à 3 » |
| vera | 2 à 3 » |
| **NAPOLEONA IMPERIALIS** (Br.) | 10 à 20 |
| **Nemathanthus** Guilleminii | 1 » |
| **NEPENTHES distillatoria** | 15 » |
| **Nerium** caudatum (Lam.) | 3 » |
| **Osbelkia** canescens | 2 » |
| **Oxalis** Barrelieri (Linn.) | 1 50 |
| **Pogostemon** Patchouly | 1 50 |
| **Pancratium.** — *Voyez le Catalogue des plantes bulbeuses et oignons.* | |
| **Peliosanthes** Teta (Andr.) | 2 » |
| **Piper** magnoliæfolium | 1 » |
| ulmifolium | 1 » |
| **Pisonia** aculeata | 3 à 6 » |
| **Pitcairnia** altense (L.)? | 1 à 3 » |
| intermedia (Hort.). *P. furfuracea* (R. M.) | 2 » |
| melananthera? | 3 » |
| punicea, *force à fleurir* | 1 » |
| Les 12 plantes | 6 » |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Pitcairnia** ringens. **Nouvelle et magnifique plante** | 3 » |
| suaveolens (Lindl.) | 2 » |
| **Pleroma** Benthamiana | 3 » |
| **Plumbago** cœrulea (Humb.) | 1 50 |
| **Plumiera** rubra | 3 » |
| **Poinciana** lutea | 6 » |
| regia (Bojar) | 5 à 20 » |
| **Polymnia** grandis | 3 » |
| **Pontederia** crassipes (Mart.) | 1 50 |
| **Pothos** cordatus (L.) | 2 » |
| longifolius, Anthurium longifolium (R. S.) | 2 » |
| undulatus | 2 » |
| **Pourretia** pyramidata (H. B.) | 3 à 5 » |
| **Puya** Altensteinii Pitcairnia | 2 à 4 » |
| **Renealmia** grandifora | 2 » |
| **Rhexia** species de la Chine | 5 » |
| **RHODOSTOMA** gardenioides | 1 à 3 » |
| **Rondeletia** speciosa (Hort.) | 2 » |
| **Ruellia** azurea | 1 » |
| varians (Vent.) | 1 » |
| **Saccharum** officiniarum (L.) | 1 50 |
| **Schotia** latifolia (Jacq.) | 5 » |
| speciosa (Jacq.) | 2 » |
| **Sinningia** guttata (Lindl.) | 1 à 4 » |
| **Sipanea** carnea | 1 à 3 » |
| **Solanum** Herbertianum | 1 » |
| quitense (N. B.) | 2 » |
| **SPECIES DE L'HONDURAS** *à feuilles très-larges, épineuses sur les deux faces, fruit grand, forme et couleur d'une orange* | 5 » |
| **Solandra** grandiflora (Swartz) | 2 » |
| nitida (Zueg.) | 3 » |
| **Spironema** fragrans | » 50 |
| **Stephanotis** floribunda | 2 » |
| **Sterculia** acerifolia (Cunningh.) | 1 50 |
| platanifolia | 2 » |
| **Strelitzia** augusta (Th.) | 30 à 100 |
| farinosa (Dryand)? | 25 à 50 |
| humilis (L.) | 5 à 15 » |
| imperialis | 100 » |
| Regina (Ait.) | 10 à 80 |
| spathulata, *vera* | 20 » |
| **Sweetenia** Mahagoni | 8 à 20 » |
| **Tacca** phalifera (Bojer) | 6 à 15 » |
| **Thalia** dealbata? an spec. nova. *Magnifique plante aquatique à fleurs très-grandes jaune serin, de Bolivia* | 10 » |
| **Theophrasta** americana | 6 à 25 » |
| **Tillandsia** amœna (Link.) | 2 » |
| farinosa | 2 » |
| nigra | 2 à 4 » |
| pyramidalis | 2 » |
| splendens | 10 » |
| Zonata, *T. Zebrina* | 3 » |
| **Tradescantia** discolor (Ait.) | 1 » |
| **Zebrina**, *pour tapisser les murs des serres chaudes* | 1 » |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Vesalia** floribunda | 1 à 3 » |
| **Vinca** rosea (L.) | 1 » |
| rosea flore albo | 1 » |
| **Wachendorfia** thyrsiflora (Lin.) | 2 » |
| **Xylophylla** arbuscula (W.) | 1 50 |
| falcata (W.) | 1 50 |
| **Xylophylla** latifolia | 2 » |
| pinnatifida | 2 » |
| **Zephyranthus.** — *Voyez le Catalogue des oignons et bulbes.* | |
| *Une collection de 25 plantes bien assorties à mon choix* | 25 » |

## CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANEÆ.

| La pièce. | fr. |
|---|---|
| **Areca** pinanga | 10 à 60 |
| rubra (Boyr.). *Euterpe pisifera* | 5 à 15 |
| *Un exemplaire de* $2^{m}$,50, *fort* | 50 |
| **ATALEA COHUNE** (Mart.), *jeune plante* | 100 |
| **Bactris** setosa | 10 à 30 |
| flavispina | 15 à 20 |
| **BRAHEA DULCIS** (Mart.). *Coripha dulcis*, très-fort, *un exemplaire magnifique* | 300 |
| **Carludowigia** angustifolia | 5 à 25 |
| latifolia | 8 à 30 |
| palmata | 8 à 20 |
| **Caryota** urens (Linn.) | 35 |
| **Ceratozamia** Mexicana | 30 à 50 |
| **Chamædora** elegans | 20 à 50 |
| elatior | 20 à 30 |
| scandens? | 15 |
| Schiedeana | 5 à 15 |
| **Chamærops** excelsa (Thunb.) | 2 |
| *Deux exemplaires d'égale hauteur,* 65 *centimètres en tige* | 25 |
| humilis (Linn.) | 2 à 15 |
| Palmetto (Mich.) | 2 |
| *Deux forts exemplaires d'égale grandeur* | 25 |
| *Un exemplaire beaucoup plus fort.* | 30 |
| **Cocos** chilensis. *Jubea spectabilis* | 3 à 10 |
| flexuosa, *fort.* | 60 |
| oleracea | 18 à 15 |
| species N° 1, *de* 2 *mètres de hauteur.* | 100 |
| **CORYPHA AUSTRALIS**, *forte plante, pétioles des feuilles de* $1^{m}$,50 *de long, magnifique* | 500 |
| Miraguama, *Copernica Miraguama* | 5 à 25 |
| **Cycas** circinalis | 20 à 60 |
| revoluta | 5 à 80 |
| species N° 1 | 100 |
| N° 2 | 100 |
| **DIPLOTHEMIUM Martinicensis,** très-fort | 100 |
| **Elais** guienensis | 20 à 120 |
| **Elate** sylvestris. *Phœnix sylvestris* | 10 à 30 |
| **Euterpe** caraibea. *Oreodoxia oleracea.* | 10 à 25 |
| **Fulchironia** senegalensis. *Phœnix sylvestris* | 10 à 50 |
| **Guilielma** speciosa | 80 |
| **Latania** rubra | 70 |
| **Oreodoxia** acuminata | 10 |
| regia | 5 à 40 |
| **Palmier** nouveau de l'Honduras | 60 à 100 |
| **Pandanus** graminifolius | 1 à 15 |
| inermis | 10 à 20 |
| pygmeus | 10 |
| utilis | 20 à 130 |
| **Phœnix** dactilifera | 1,50 à 25 |
| **Pinanga** latisecta | 5 à 10 |
| **Sabal** Adansoni | 1 à 15 |
| **Sagus** farinifera | 100 |
| **Zalacca** asamica | 30 à 40 |
| **Zamia** horrida | 30 |
| *Un très-grand exemplaire* | 200 |
| integrifolia | 20 à 80 |
| lanuginosa | 40 à 100 |
| muricata | 10 à 20 |
| pumila | 40 |
| pungens | 40 à 100 |
| spiralis | 5 à 60 |
| tridendata | 40 |

## FOUGÈRES.

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Acrosticum** alcicorne (Sw.) | 1 » |
| * aureum (L.) | 1 50 |
| conforme | 3 » |
| * **Adianthum** assimile (Sw.) *A. tigrinum* (Labil.) | 1 50 |
| † capillus veneris | » 50 |
| **Adianthum** concinnum (H.) | 1 » |
| curvatum | 1 » |
| formosum (R. Br.) | 1 50 |
| Moritzianum | 2 » |
| † pedatum | 1 » |
| pubescens (Schk.) | 1 » |

| *La pièce.* | fr. | c. |
|---|---|---|
| ***Adianthum** tenerum (Sw.) . . . . | 1 | 50 |
| * trapeziforme (L.). . . . . . . . . | 2 | » |
| * **Alontodia** umbrosa . . . . . . . | 2 | » |
| **Aneimia** collina (Radd.). . . . . . | 1 | 50 |
| **Anagramma** leptophylla . . . . . | 1 | » |
| †**Aspidium** aculeatum . . . . . . | 1 | » |
| brassiliense (Willd.) . . . . . . . | 1 | » |
| * capense (Willd.) . . . . . . . . | 1 | 50 |
| * cuneatum. . . . . . . . . . . | 1 | » |
| * exaltatum. *Polypodium exaltatum* . | 1 | » |
| falcatum (Sw.) . . . . . . . . . | 1 | 50 |
| * fœniscei . . . . . . . . . . . | 1 | » |
| †fragile . . . . . . . . . . . | » | 50 |
| * marinum . . . . . . . . . . | 1 | » |
| patens. . . . . . . . . . . . | 1 | 75 |
| viviparum ?. . . . . . . . . . | » | 75 |
| †**Asplenium** Adiaathum nigrum . . | » | 50 |
| bisserratum (Presl.) . . . . . . . | 1 | 50 |
| †germanicum (Weiss.) . . . . . . | 1 | » |
| furcatum (Thunb.) . . . . . . . . | 2 | » |
| †Ruta muraria (Lin.). . . . . . . | 1 | 50 |
| †septentrionale (Sw.). . . . . . . | » | 50 |
| †trichomanes (L.). . . . . . . . | » | 50 |
| †**Athyrium** filiix fœmina (Roth.) . . | » | 50 |
| **Blechnum** glandulosum. . . . . . | 1 | » |
| * gracile (Kaulf.). . . . . . . . | 1 | » |
| * lanceolatum (Rud.). . . . . . . | 1 | 50 |
| **Campiloneurus** decurrens . . . . | 10 à 20 | |
| **Ceropteris** sulphurea. . . . . . . | 1 | » |
| * **Coenopteris** japonica (Thunb.). . | » | 75 |
| **Cheilanthes** lentigera . . . . . . | 1 | 50 |
| micronema . . . . . . . . . . | 1 | 50 |
| pteridioides. . . . . . . . . . | 1 | » |
| tomentosa . . . . . . . . . . | 1 | » |
| viscosa . . . . . . . . . . . | 1 | 50 |
| **Chrysopteris** spherodocarpa . . . . | 2 | » |
| **CYPOTIUM SCHIEDEI,** magnifique fougère en arbre . . . . . . . | 10 à 50 | |
| †**Cystopteris** fragiles (Desu.). . . . | » | 50 |
| **Davallia** canariensis . . . . . . | 1 | » |
| **Dicksonia** Davallioides . . . . . . | 3 | » |
| pilosiuscula. . . . . . . . . . | 1 | 50 |
| rubiginosa . . . . . . . . . . | 1 | » |
| **Didymochlena** sinuata . . . . . . | 10 à 25 | |
| **Diplazium** decussatum ? . . . . . . | 3 | » |
| pubescens . . . . . . . . . . | 1 | 50 |
| * **Doodia** aspera (R. B.) . . . . . | 1 | » |
| * distans . . . . . . . . . . . | 1 | 50 |
| lupulata ?. . . . . . . . . . . | » | 50 |
| rupestris. . . . . . . . . . . . | » | 50 |
| * **Gymnogramme** chrysophylla (B.). | 1 | » |
| * calomelanos (Kaulf.). . . . . . . | 1 | » |
| **Lycopodium** alpinum (L.). . . . . | » | 50 |
| * apodum (L.). . . . . . . . . . | 1 | » |
| brasiliense . . . . . . . . . . | » | 75 |
| cœsium, *charmante plante, les feuilles sont à reflets azurés* . . . . | » | 75 |
| * circinatum . . . . . . . . . . | » | 50 |
| * cordifolium . . . . . . . . . . | » | 50 |

| *La pièce.* | fr. | c. |
|---|---|---|
| * **Lycopodium** denticulatum . . . . | » | 50 |
| †selago . . . . . . . . . . . . | » | 50 |
| †selaginoides . . . . . . . . . . | » | 50 |
| * stoloniferum (Sw.) . . . . . . . | » | 50 |
| **Microsorus** irregularis . . . . . . | 1 | 50 |
| †**Nephrodium** acrostichoides (Mich.). | 2 | 50 |
| †dilatatum (Desw.). . . . . . . . | 1 | » |
| †filiix mas. (Desv.). . . . . . . . | 1 | » |
| †Oreopteris (Desv.) . . . . . . . | » | 50 |
| * tuberosum . . . . . . . . . . | 1 | » |
| **Niphopolus** chinensis. . . . . . . | 2 | » |
| rupestris . . . . . . . . . . . | 1 | 50 |
| **Notochlena** pumila. . . . . . . . | 1 | 50 |
| † **Onoclea** sensibilis. . . . . . . . | 1 | » |
| † **Osmunda** interupta. . . . . . . | 3 | » |
| †regalis . . . . . . . . . . . | 1 | » |
| †**Phorolopus** crispus. *Pteris crispa* . | 1 | » |
| * **Polypodium** aureum (L.). . . . . | 1 | » |
| †calcareum . . . . . . . . . . | 1 | » |
| * crassifolium (W.). . . . . . . . | 3 | » |
| †dryopteris (L.). . . . . . . . . | 1 | » |
| * effusum (Sw.) . . . . . . . . | 2 | » |
| harpeoides . . . . . . . . . . | 3 | » |
| longifolium. . . . . . . . . . . | 1 | 50 |
| paradisiæ (Willd.) . . . . . . . . | 1 | » |
| †rhæticum (Linn.). . . . . . . . | 1 | » |
| vacillans . . . . . . . . . . . | 3 | » |
| †vulgare (Linn.). . . . . . . . . | » | 50 |
| * **Pteris** arguta (Willd.) . . . . . . | 3 | » |
| * biaurita. . . . . . . . . . . | 6 | » |
| * chrysocarpa . . . . . . . . . . | » | 50 |
| * crenata (L.) . . . . . . . . . | 2 | » |
| * falcada (R. B.). . . . . . . . . | 2 | » |
| * flexuosa . . . . . . . . . . . | 2 | » |
| * hastata . . . . . . . . . . . | 1 | » |
| * leptophylla (Sw.). . . . . . . . | 1 | 50 |
| * longifolia . . . . . . . . . . | 2 | » |
| * nemoralis (W.). . . . . . . . . | 1 | » |
| * serrulata (Willd.). . . . . . . . | 2 | » |
| stenophylla. . . . . . . . . . . | 2 | » |
| †**Scolopendrium** officinarum (L ). . | » | 75 |
| †cristatum . . . . . . . . . . | 2 | » |
| †uudulatnm . . . . . . . . . . | 1 | » |
| †**Struthiopteris** germanica (W.) . . | » | 50 |
| * **Woodwardia** Onocleoides (Willd.). | 2 | » |
| *Une collection de 10 espèces, à mon choix* . . . . . . . . . . . . | 10 | » |

*Les espèces de serre chaude conviennent bien dans un local où l'on cultive les Orchidées des pays chauds. Leurs feuillages déliés se marient d'une manière très-agréable avec les formes larges et vigoureuses des dernières.*

*Les espèces marquées d'un * peuvent être cultivées en serre tempérée. Celles marquées d'une † sont pour la pleine terre. Celles sans marques doivent être cultivées en serre chaude.*

# ORCHIDEÆ.

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Acropera** Loddigesii (Lindl.). Maxillaria galeata (Lodd.) | 5 » |
| luteola | 7 à 10 » |
| **Angræcum** maculatum (Lindl.) | 5 » |
| **Bifrenaria** atropurpurea. *Maxillaria*. | 5 à 8 » |
| **Bletia** gracilis (Lindl.) | 10 » |
| hyacinthina (R. Br.) | 3 » |
| purpurea ? | 20 » |
| verecunda (H. Kew.). Limodorum altum (Jacq ) | 4 » |
| Woodforti | 30 » |
| **Brassavola** venosa | 8 à 10 » |
| **Broughtonia** sanguinea | 20 » |
| **Calanthe** bicolor | 7 à 10 » |
| veratrifolia | 10 » |
| **Cattleya** crispa (Lindl.) | 12 à 20 |
| Forbesii (Lindl.) *isopetala?* | 5 à 10 » |
| piperita | 50 » |
| **Cymbidium** aloifolium (Sw.) | 5 à 10 » |
| ensifolium (Sw.) | 2 » |
| dependens (Bot. Cab.) | 20 » |
| sinenses (Willd.) | 5 » |
| * **Cypripedium** insigne (Wall.) | 3 à 5 » |
| * purpuratum | 25 » |
| * venustum (Wall.) | 5 à 10 » |
| * **Cyrtopodium** Andersonii (R. Br.) | 20 à 30 |
| **Dendrobium** aggregatum (Lindl.) | 20 » |
| Baringtonii | » » |
| buxifolium ? | 5 » |
| humile | 6 à 10 » |
| moschatum | » » |
| nobile | 15 à 30 |
| Oncidioidis | » » |
| Pierardi. *D. cuculatum* | 5 à 10 » |
| * pulchellum. (Roxb.) | 3 à 10 » |
| * speciosum (Sm.) | 5 » |
| **Epidendron** ciliaire (Willd.) | 8 à 10 » |
| * cochleatum (L.) | 3 à 5 » |
| * latifolium | 10 » |
| crassifolium | » » |
| cuspidatum (Lodd.) | 5 » |
| elongatum (Jacq ) | 2 » |
| polybulbon (Sw.) | 4 » |
| species du Mexique | 34 » |
| **Eria** pubescens (Lindl.) | 10 » |
| rosea | 15 » |
| stellata (Lindl ) | 10 » |
| **Gongora** atropurpurea (Hook.) | 15 » |
| pallida | 15 » |
| **Grobya** Ambertiœ | 15 à 20 |
| * **Hoemaria** discolor | 3 » |
| * **Lælia** acuminata | 40 » |
| albida | 20 » |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Lycaste** Skinneri (Flore) | 10 » |
| * **Maxillaria** aromatica (Grah.) | 5 à 10 » |
| densa | 3 à 6 » |
| * Deppei (Lodd.) | 5 à 10 » |
| * Harrisoniæ (Lindl.) | 6 à 8 » |
| punctata (Lood.) | 5 » |
| species ex Brass N° 1 | 50 » |
| squalens (R. Br.). Dendrobium squalens (R. Br.) | 3 » |
| stapelioides (Lindl.) | 5 à 20 » |
| tetragona (Lindl.) | 15 » |
| * **Neottia** picta (Sims.) | 3 » |
| **Odontoglossum** Lindleyii | 15 à 25 |
| * **Oncidium** Ceboletta | 1 à 2 » |
| macrochilum | 10 à 20 |
| * papilio (Lind.) | 20 à 30 |
| sciurus | 30 » |
| Species du Mexique | 80 à 100 |
| Species N° 3 de l'Honduras | 50 » |
| N° 4. » | 50 » |
| S. H. du Brésil | 50 » |
| * **Peristeria.** Species della Guera | 80 à 100 |
| * **Phajus** grandifolius (Lour.) Limodorum Tankervilliæ (W.) | 3 » |
| **Pholidota** imbricata (Lindl.) | 4 » |
| * **Renanthera** coccinea (R. Br.) | 10 » |
| rosea? | 20 » |
| **Rodriquezia** Barkeri (B. R.) | 10 » |
| **Schomburgkia** crispa | 20 à 40 |
| * **Stanthopæa** eburnea | 8 à 10 » |
| grandiflora (Sw.) | 10 » |
| * insignis (B. M.) | 6 à 12 » |
| * oculata (Sw.) | 6 à 15 » |
| odoratissima | 20 » |
| quadricornis | 35 » |
| saccata | 20 » |
| tigrina | 20 » |
| Wardii | 15 à 25 |
| * **Stenorrynchus** speciosus (B. M.). *Neottia speciosa (Hook)* | 5 » |
| **Trichopelia** tortilis | 20 à 30 |
| **Vanilla** aromatica (H. K ) | 20 » |
| claviculata | 20 » |
| planifolia | 5 » |
| pomponia | 10 » |
| * **Zygopetalum** crinitum (B. K.) | 15 » |
| Makayi (B. M.) | 15 » |
| * maxillaria (Sw.) | 10 à 20 |
| odoratissimum | 30 à 50 |
| * stenochylum (Sw.) | 10 » |
| *A mon choix*, 20 *espèces d'Orchidées* | 50 » |

*Une chaleur de* 12 *à* 15° *Réaumur suffit pour les espèces marquées d'un* *.

# PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

| *La pièce.* | fr. c. |
|---|---|
| **Acacia** alata (DC.) . . . . . . . . | 1 » |
| Berteriana (Spr,). . . . . . . . . . | 1 a 2 » |
| biflora (R. Br.). *A. hastulata?* . . . | 1 » |
| chrysobotrya (Meis ). . . . . . . . | 5 » |
| cordata (Sweet.). . . . . . . . . . | 3 » |
| cuneata (Renth.). . . . . . . . . . | 2 » |
| cyanophylla (Renth.), Ac. Swanriver (Hort.) . . . . . . . . . . . | 5 » |
| dealbata (Link.). *A. affinis* (Sweet.) . | 1 50 |
| 12 *jeunes plantes* . . . . . . . | 6 » |
| Esterhazy. . . . . . . . . . . . . | 1 » |
| floribunda (Willd.). . . . . . . . . | 2 » |
| frondosa (Willd.) . . . . . . . . . | 1 » |
| glaucifolia. *A. cultrœformis* . . . . | 2 à 5 » |
| heterophylla . . . . . . . . . . | 2 » |
| latifolia (Desf.) . . . . . . . . . . | 1 » |
| longifolia glauca. . . . . . . . . . | 10 » |
| Lophanta (Willd.). . . . . . . . . | 1 à 4 » |
| lunata nova. . . . . . . . . . . . | 8 » |
| mucronulata (Mak.) . . . . . . . . | 5 » |
| paradoxa (DC.) . . . . . . . . . . | 1 » |
| pinifolia (Hortul.) . . . . . . . . . | 1 50 |
| glauca? an spec. nova Swanriver . | 30 » |
| platyptera . . . . . . . . . . . . . | 1 à 4 » |
| prostrata (Lodd.). Diffusa (Ker.) . . | 2 à 6 » |
| pulchella (R. Br.) . . . . . . . . . | 1 » |
| 50 *jeunes plantes*. . . . . . . . . | 30 » |
| speciosa nova. . . . . . . . . . . | 4 » |
| robusta?. . . . . . . . . . . . . . | 3 » |
| suaveolens (Willd.). . . . . . . . . | 1 » |
| species de Swanriver. . . . . . . | 30 » |
| truncata (Hortul.) . . . . . . . . . | 1 » |
| verticillata (Willd.). . . . . . . . | 1 » |
| vestita (R. Br.) . . . . . . . . . . | 1 à 4 » |
| **Agapanthus** foliis variegatis . . . . | 1 » |
| **Agave** Americana (Linn.), petit . . . | 1 50 |
| moyenne force . . . . . . . . . | 30 » |
| très-fort . . . . . . . . . . . . . | 200 » |
| foliis variegatis, petit. . . . . . . | 1 50 |
| moyenne pour vases, la paire. . . | 20 » |
| foliis striatis . . . . . . . . . . . | à 4 » |
| virginica (Linn ). . . . . . . . . . | 1 » |
| **Agonis marginata** . . . . . . . | 1 50 |
| **Aloe** arborescens (Mill.) . . . . . . | 3 à 30 » |
| atrovirens (DC.). *Haworthia margaritifera* (Haw.). . . . . . . . . | 1 50 |
| mitræformis (Willd.) . . . . . . . . | 1 50 |
| plicatilis? . . . . . . . . . . . . . | 1 50 |
| Radula (Jacq.) . . . . . . . . . . | 1 » |
| variegata (Lin.) . . . . . . . . . . | 1 50 |
| virens (Haw.). . . . . . . . . . . | 1 50 |
| 6 *espèces assortis avec noms* . . . | 4 » |
| **Alstroemeria** aurea (Gr.). . . . . . | 1 » |
| **Du Chili**, en plusieurs variétés . . | 2 » |
| Pelegrina (L ). . . . . . . . . . . | 1 » |
| psittacina (Lehm.) . . . . . . . . . | 1 » |

| *La pièce.* | fr. c. |
|---|---|
| **Amicia** Zygomeris (DC.). . . . . . | 50 c. à 2 |
| **Anagallis** lilacina grandiflora. . . . | » 50 |
| philipsi . . . . . . . . . . . . . | » 50 |
| superba . . . . . . . . . . . . . | » 50 |
| **Anigozanthus** Lindeni . . . . . . | 3 » |
| **Amaryllis.** *Voyez le catalogue des ognons et bulbes.* | |
| **Aralia** crassifolia . . . . . . . . . | 10 à 40 |
| pinnata . . . . . . . . . . . . . | 4 » |
| trifoliata . . . . . . . . . . . . . | 6 à 20 |
| **Araucaria.** *Voyez le catalogue des Conifères*, première partie. | |
| **Abrutus** Andrachne (Willd.) . . . . | 1 » |
| canariensis (L.) . . . . . . . . . | 2 » |
| floribunda . . . . . . . . . . . . | 2 » |
| hybrida . . . . . . . . . . . . . | 2 » |
| longifolia (Loid·) . . . . . . . . . | 2 » |
| Milleri (Don.) . . . . . . . . . . | 2 » |
| unedo. . . . . . . . . . . . . . | 1 » |
| Species N° 1, Mexique . . . . . | 4 » |
| » N° 2, » . . . . . | 5 » |
| » N° 3, » . . . . . | 4 » |
| *Ces trois espèces sont bien belles et se distinguent parfaitement entre elles.* | |
| **Aristolelia** Maqui (Hérit.). *Cornus chilensis Molin.* . . . . . . . . | 1 50 |
| **Ardisia** japonica . . . . . . . . . | 1 » |
| **Astelia** Banksii . . . . . . . . . | 1 » |
| **Aster** moschatus . . . . . . . . . | 1 » |

**AZALEA INDICA (L.).**

**Rhododendron indicum** (Sw.)

| | |
|---|---|
| alba. . . . . . . . . . . . . . | 50 c. à 3 f. |
| plena . . . . . . . . . . . . | 50 c. à 3 f. |
| Aitoni. . . . . . . . . . . . . | 1 » |
| ardens nova . . . . . . . . . . | 1 50 |
| augusta (Lady) . . . . . . . . . | 1 à 2 » |
| aurantiaca duplex . . . . . . . . | 1 à 4 » |
| bicolor . . . . . . . . . . . . | 1 à 3 » |
| carnea floribnnda . . . . . . . . | 1 à 2 » |
| superba . . . . . . . . . . | 1 à 2 » |
| coccinea grandiflora . . . . . . . | 1 à 2 » |
| concolor. . . . . . . . . . . . | 1 à 2 » |
| Crimson . . . . . . . . . . . . | 50 c à 2 f. |
| Cunninghami . . . . . . . . . . | 50 c. à 2 f. |
| Danielsi . . . . . . . . . . . . | 1 à 2 » |
| grandiflora . . . . . . . . . | 2 à 3 » |
| Diego Leon. . . . . . . . . . . | 3 » |
| elata plena . . . . . . . . . . | 1 à 2 » |
| Exquisite . . . . . . . . . . . | 2 à 3 » |
| Foordi . . . . . . . . . . . . | 1 50 |
| grandiflora . . . . . . . . . . | 1 50 à 3 |
| Hibbertii. . . . . . . . . . . . | 50 c. à 2 f. |
| insignis pleno. . . . . . . . . . | 1 à 2 » |
| Jenneri . . . . . . . . . . . . | 1 50 |
| macrantha . . . . . . . . . . . | 50 c. à 3 f. |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Azalea indica** Mazeppa | 1 » |
| Mazoratti | 2 » |
| mutabilis | 1 » |
| Nedersiana | 2 à 3 » |
| new white | 1 » |
| Orange pink | 1 » |
| phœnicea grandiflora | 1 à 3 » |
| pulchella | 50 c. à 2 f |
| pulcherrima pallida | 1 » |
| vera | 2 à 3 » |
| pulchra | 1 50 |
| punicea | 50 c. à 1 f. |
| Rawsoni | 1 » |
| rotundifolia | 1 » |
| Salmon | 1 » |
| Skrimakerski | 1 » |
| Smithii coccinea | 1 » |
| elegans | 2 » |
| speciosa | 50 c. à 2 f. |
| superba plena | 1 à 2 » |
| Thomasii | 1 » |
| triumphans | 1 50 |
| variegata | 3 » |
| Wandesi | 1 » |
| Youngii | 1 à 2 » |
| Rhododendroides | 1 50 |
| Sinensis | 1 à 4 » |
| *Une collection de 24 variétés à mon choix* | 15 » |
| *Une collection de 12 variétés, à mon choix* | 6 » |

**Variétés assortis.**

| | |
|---|---|
| *Plantes de moyenne force en 20 variétés, le 100* | 40 » |
| *Plantes fortes en boutons en 20 variétés, le 100* | 60 » |
| *Plantes très-fortes en boutons, mélangés, le 100* | 70 » |
| **Bæckea** camphorata (R. Br.) | 1 » |
| **BANKSIA** armata | 5 » |
| australis (R. Br.) | 5 » |
| collina (R. Br.) | 3 » |
| cuneifolia (Wendl.) | 3 à 4 » |
| Cunninghami (Sieb.) | 4 » |
| denticulata (DC.) | 3 » |
| Dryandroides (Baxt.) | 8 à 15 » |
| ericæfolia (L. F.) | 2 à 10 » |
| integrifolia (L. F.) | 4 » |
| latifolia (R. Br.) | 5 » |
| littoralis (R. Br.) | 4 » |
| marcecens (R. Br.) | 3 » |
| marginata (Cav.) | 4 » |
| oblongifolia (Cav.) | 3 » |
| præmorsa (Andr.) | 4 » |
| serrata (L.) | 3 » |
| spinulosa (Sm.) | 2 » |
| verticillata (R. Br.) | 3 » |
| **Bauera** rubioides (And.) | 1 » |
| **Beaufortia** decussata | 1 à 2 » |
| splendens (Baxt.) | 1 » |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Berberis** tenuifolia (Lindl.) | 3 à 10 » |
| trifoliata | 2 à 10 » |
| **Berzelia** lanuginosa | 1 à 3 » |
| **Billardiera** fusiformis (Lab.). Sollya heterophylla (Lindl.) | 1 » |
| **Boronia** alata (Sm.) | 2 » |
| crenulata | 1 à 3 » |
| serrulata (Sm.) | 2 » |
| viminea | 1 » |
| **Bossiæa** thymifolia (Hort.) | » 50 |
| **Bouvardia** flava | » 75 |
| strigulosa | 50 c. à 1 f. |
| **Brachysema** platyptera. *Sontania Celsania* | 3 à 10 » |
| undulatum | 1 » |
| **Brunia** imbricata (Wendl.) | 1 à 2 » |
| nodiflora | 1 à 2 » |
| **Brunswigia** Josephina (Ker.) | 5 » |
| **Buddleia** Lindleyana | 1 » |
| **Bumelia** tenax | 1 » |
| **Burchellia** capensis (R. Br.) | 1 à 3 » |
| **CALCEOLARIA.** *Une collection de 12 belles variétés à mon choix* | 9 » |
| *Une collection de 12 variétés de second choix* | 6 » |
| **Callistachys** Drummondi | 5 » |
| **Calothamnus** Baxteri | 3 » |
| longissima (Hort.) | 2 » |
| quadrifida (R. Br.) | 1 » |
| Shœnophylla nova spec. | 3 » |
| villosa (R. Br.) | 1 50 |
| species nova Swanriver | 10 » |

**CAMELLIA.**

*J'accorde une remise de 10 % pour toute demande de Camellias dépassant 50 fr., et 15 % pour celles dépassant 100 fr.*

| | |
|---|---|
| *J'offre en outre, à mon choix, 12 variétés de Camellias greffés de 2 ans, avec boutons* | 24 » |
| *12 variétés à mon choix, sans boutons* | 18 » |
| *50 variétés de Camellias greffés d'un an* | 60 » |
| *40 variétés de Camellias greffés de 2 ans* | 70 » |
| *Idem, 80 variétés* | 210 » |
| *100 pièces en 50 variétés doubles avec noms, sans boutons* | 150 » |
| *Camellias simples pour la greffe, de la force d'un tuyau de plume, le 100.* | 50 » |
| *Idem, plus forts, le 100* | 80 » |

**CAMELLIA PYRAMIDES.**

| | |
|---|---|
| *12 pièces de 3 à 5 pieds de hauteur, en bonnes variétés* | 50 » |
| *12 pièces de 6 à 8 pieds de hauteur* | 200 » |

*Je possède en outre de belles pyramides et hautes tiges, pour le prix desquelles on s'entendra par correspondance avec les amateurs.*

| | |
|---|---|
| **Camellia** axillaris (A. B.) | 1 50 à 3 |

| La pièce. | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Camellia** Euryoides (A. B.) | 1 à 3 | » |
| rosea | 1 à 3 | » |
| japonica alba fenestralis | 1 50 à 3 | |
| alba plena (A. B.) | 1 à 3 | » |
| alba lutescens (A. B.) | 1 | 3 » |
| admirabilis *Adelaïde* | 2 | 3 » |
| Æggeri | 5 | 8 » |
| *Alexandre-le-Grand | 2 | 6 » |
| *althœflora | 1 | 3 » |
| Amenta rubra | 2 | 4 » |
| *Aminta | » | 10 » |
| *†anemoneflora rosea (A. B.) | 2 | 3 » |
| *striata | 2 | 3 » |
| ***Apollo**, nouvelle d'Italie | 1 | 5 » |
| *argentea plena | 2 | 4 » |
| atra Warratah nova | 2 | 4 » |
| *aurantiaca nova | 2 | 4 » |
| *Baggroni | 3 | 4 » |
| Baumanniana (A. B.) | 2 | 3 » |
| *Beali Palmers, Beali, Leeana superbe | 3 | 4 » |
| *Bedforthii (Whithini) | 2 | 4 » |
| Belle Nanette | 2 | 4 » |
| Berleziana (A. B.) | » | 3 » |
| Bianchi | 2 | 4 » |
| *Blaw | 1 | 4 » |
| Brochi | » | 2 » |
| *Brooklyniana *d'Amérique* | 3 | 8 » |
| ***Calciali**, nouvelle d'Italie | 2 | 10 » |
| ***Campomolentina** | 4 | 20 » |
| candidissima | 2 | 3 » |
| †Candolli | 2 | 10 » |
| †**Canova** | 2 | 6 » |
| †*Caraccioli (F. B.) | 3 | 4 » |
| *Carlvelliana | 2 | 4 » |
| Chandleri (A. B.) | 2 | 5 » |
| Charles-Auguste | 2 | 3 » |
| Charlemagne | » | 3 » |
| China (A. B.). Reves nova | 2 | 3 » |
| *Climène (belle), F. R. | 1 | 3 » |
| Cliveana (A. B.) | 2 | 5 » |
| Columbo | 2 | 5 » |
| *compacta | » | 4 » |
| *conchiflora (Aglaé) | 2 | 3 » |
| conspicua | 1 50 à 3 | |
| corallina (A. B.) | 2 à 5 | » |
| coronata | » | 2 » |
| coronatissima | 2 | 3 » |
| Crimson perfection | 2 | 6 » |
| cruciata | » | 6 » |
| *Dalleni | 2 | 5 » |
| *Dallisch | » | 5 » |
| *†**Dario** | 4 | 10 » |
| *decora | 2 | 5 » |
| ***Delairi** *(Aug. et Nap. Baumann)*, variété très-double, obtenue de graines, premier choix | 10 | 20 » |
| *delicatissima | 2 | 4 » |
| Delphino (Sada) | » | 5 » |
| depressa | 2 | 3 » |

| La pièce. | fr. | c. |
|---|---|---|
| ***Camellia** Diva Maria | 5 | » |
| *†Donckelari (A. B.) | 1 50 à 5 | |
| Dorsetti | 1 50 | |
| Drummondi | 2 à 4 | » |
| Duchezza Litta | 3 | 7 » |
| *Duche se de Nemours | » | 2 » |
| *Dunlap's americana | » | 6 » |
| Dux Litta | 3 | 10 » |
| Eclipse ou Pressi, Prestons Eclipse (Regina Gallorum) | 2 | 3 » |
| Egerstonia | 2 | 4 » |
| *elegantissima (A. B.) | 2 | 4 » |
| elata (Chandleri) | » | 3 » |
| *Elisabeth impériaie | 2 | 4 » |
| *Elphinstonii (A. B.) | 2 | 3 » |
| *Fpsomiana | » | 2 » |
| eximia (vera) (A. B.) | 2 | 4 » |
| Feasti (M. Walter's) | 3 | 20 » |
| †fimbriata alba plena | 2 | 3 » |
| rubra | 4 | 6 » |
| *flammea (A. B.) | 2 | 4 » |
| *flammeola superba, *voir Elphinstoni.* | | |
| *†flavescens (alba lutescens) | 2 | 4 » |
| florida rosea | 2 | 4 » |
| *†Floy. *Grand Frédéric* | 2 | 4 » |
| *Fordii. *C. Devoniensis* | » | 4 » |
| *formosa (B. A.), *formosissima.* | 2 | 4 » |
| *Francofurtensis. *Wellingtoni* | 2 | 3 » |
| Futtung, Reawesi, Rezeanum | 2 | 4 » |
| gallica alba (A. B.) | 2 | 4 » |
| général Zughsi. *Varischi* | 6 | 8 » |
| **Gerandoi** *(nobis)* | » | 30 » |
| *Ghittina | 3 | 5 » |
| *gigantea (A. B.) | 2 | 3 » |
| Gioja | » | 4 » |
| *Gelisi *(Nancy Dawton)* | 2 | 3 » |
| *gloria mundi | 2 | 3 » |
| *Gozzi | 2 | 8 » |
| Grafton Lady. *Lady preciosa.* | 1 50 à 3 | |
| ***Greissi** *(Aug. et Nap. Baumann)* | 1 à 10 | » |
| Grunelli | 2 | 3 » |
| *Harrisoni, *blanc* | » | 3 » |
| Haylocki (Lokarl) | 2 | 3 » |
| *heptangularis | 2 | 4 » |
| Hebertii (A. B.) | 2 | 4 » |
| Henri Favre | 2 | 5 » |
| *hexangularis | 2 | 3 » |
| *humilis | » | 4 » |
| *Il Fauno | » | 5 » |
| *imbricata (A. B.) | 2 | 3 » |
| *albo pleno (A. B.), triomphans albo, albo picta | 2 | 3 » |
| *imbricata spiraliter | 3 | 5 » |
| *imperialis | » | 3 » |
| †*incarnata | 2 | 3 » |
| involuta (myrtifolia) | 2 | 3 » |
| ***Jahnii** *(Aug. et Nap. Baumann)* | » | 20 » |
| Kings royale, Clussi (A. B.) | » | 3 » |
| *Kookia | 2 | 4 » |

| La pièce. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| * **Camellia** japonica Lamberti. . . . | » | à 4 | » |
| lactea . . . . . . . . . . . . . | » | 3 | » |
| Lassiana . . . . . . . . . . . . | » | 5 | » |
| * Lechit . . . . . . . . . . . | » | 4 | » |
| Leeana superba (A. B.) Sieboldti . | 2 | 4 | » |
| Lemairi . . . . . . . . . . . . | 3 | 4 | » |
| Leopoldina . . . . . . . . . . . | » | 4 | » |
| * lilacina superba . . . . . . . | » | 3 | » |
| L'infanto. . . . . . . . . . . . | » | 4 | » |
| Loudon . . . . . . . . . . . . | 2 | 5 | » |
| * lucida (A. B.) . . . . . . . . | 2 | 4 | » |
| lutescens. . . . . . . . . . . . | » | 3 | » |
| Lussiana . . . . . . . . . . . . | » | 3 | » |
| * Macdonaldi . . . . . . . . . | » | 4 | » |
| * magniflora plena . . . . . . . | » | 3 | » |
| maliflora. Sassangua roseo plena, multiflora . . . . . . . . . | 2 | 3 | » |
| * Manotti . . . . . . . . . . | 2 | 4 | » |
| Manzoni. . . . . . . . . . . . | 2 | 5 | » |
| Maometto . . . . . . . . . . . | 3 | 4 | » |
| Maria Dorotheo (F. B.). . . . . | 1 | 3 | » |
| Maribrandi . . . . . . . . . . . | » | 3 | » |
| * **Marie Padilla**, nouvelle d'Italie | 3 | 10 | » |
| * marmorata (A. B.) . . . . . . . | 2 | 3 | » |
| Marshall Wilder's aurora (F. B.) . | 2 | 3 | » |
| * Martha. . . . . . . . . . . . | » | 20 | » |
| medicea . . . . . . . . . . . . | 2 | 4 | » |
| † Melinetti . . . . . . . . . . | » | 2 | » |
| * Melissa. . . . . . . . . . . . | » | 3 | » |
| * Merilli . . . . . . . . . . . | » | 3 | » |
| * Micantica. . . . . . . . . . . | » | 4 | » |
| * mira. . . . . . . . . . . . . | 2 | 3 | » |
| * Miss Gunnel . . . . . . . . . | 6 | 30 | » |
| monstrosa . . . . . . . . . . . | 2 | 4 | » |
| * Monti . . . . . . . . . . . | 2 | 4 | » |
| * Montironi. . . . . . . . . . . | » | 3 | » |
| * mutabilis, Traversi (A. B.) . . . | 2 | 5 | » |
| * **Muziana** (*Aug.-N. Baumann*), nouveau de semis, superbe . . | » | 10 | » |
| myrtifolia (A. B.) . . . . . . . | 1 | 50 | à 3 |
| * Napoléon (de France) . . . . . | 2 | à 6 | » |
| * Nassiniana . . . . . . . . . | 2 | 3 | » |
| * **Neippergense** (N. B.), nouvelle et magniflque fleur rose saumonnée, maculée de blanc. . . | » | 10 | » |
| * **Neoboracensis**, nouvelle d'Amérique . . . . . . . . . . | 2 | 10 | » |
| * nobilissima (A. B.). Waddi (A. R.) | 2 | 3 | » |
| Norma . . . . . . . . . . . | » | 8 | » |
| ochroleuca . . . . . . . . . . . | » | 2 | » |
| * Oleifera latifolia . . . . . . . | » | 2 | » |
| * Omboni . . . . . . . . . . | » | 4 | » |
| Orlando . . . . . . . . . . . . | 2 | 5 | » |
| * ornata (A. B.). . . . . . . . . | 2 | 3 | » |
| * Oudiniana . . . . . . . . . | 2 | 5 | » |
| Ourselli . . . . . . . . . . . . | 2 | 10 | » |
| †* Oxoniensis (A. B.) . . . . . | 2 | 3 | » |
| * pæoniflora rosea (A. B.) . . . . | 1 | 3 | » |
| Palladinus Hungaricus . . . . . | » | 3 | » |
| * palladio (Sada). . . . . . . . | | 3 | 50 |

| La pièce. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|
| **Camellia** japonica pallida nova . . . | 2 | à 4 | » |
| Parmentieri nivea . . . . . . . . | » | 3 | » |
| * Park's strieped (Parksii) . . . . | 2 | 3 | » |
| Partheniana . . . . . . . . . . | » | 4 | » |
| * Pawhattow . . . . . . . . . | 3 | 20 | » |
| * Pawlikowski rosea . . . . . . | 2 | 3 | » |
| †* perceya (A. B.). . . . . . . . | 2 | 3 | » |
| Peregalli. . . . . . . . . . . . | » | 5 | » |
| * Pénélope . . . . . . . . . . | » | 5 | » |
| * **Percyvalii**, nouv. d'Amerique. | 3 | 6 | » |
| * Perfecta carminea. . . . . . . . | 3 | 5 | » |
| Pie IX . . . . . . . . . . . . | » | 10 | » |
| * Presley's Victoria. *Queen Victoria* | 3 | 10 | » |
| * pictorum roseum . . . . . . . . | 2 | 15 | » |
| * Pierre . . . . . . . . . . . . | » | 5 | » |
| * Pomponia alba. . . . . . . . . | 1 | 3 | » |
| * rosea. . . . . . . . . . . . | 1 | 3 | » |
| Porta . . . . . . . . . . . . . | » | 4 | » |
| **Pratomolentina** . . . . . . | » | 20 | » |
| Preston Eclipse (A. B.) . . . . . . | 2 | 3 | » |
| * Prince d'Orange . . . . . . . | 2 | 5 | » |
| * Princesse Amélie. . . . . . . . | 2 | 5 | » |
| * pulchella . . . . . . . . . . | » | 3 | » |
| * pulcherrima striata . . . . . . | 2 | 5 | » |
| punctata major (*invincible*). . . . | 2 | 3 | » |
| rosea plena. . . . . . . . . | 2 | 4 | » |
| * Pyroleana. . . . . . . . . . | 2 | 8 | » |
| * Queen Victoria . . . . . . . | 5 | 10 | » |
| * **Radaellii** . . . . . . . . . | 6 | 10 | » |
| Radicans (Sada) . . . . . . . . | » | 4 | » |
| Rambuteau (Madame). . . . . . . | » | 6 | » |
| * Regina Gallorum . . . . . . . | 2 | 3 | » |
| * Regina (Kings). . . . . . . . . | » | 3 | » |
| Reigneri. . . . . . . . . . . . | 2 | 4 | » |
| * Revini . . . . . . . . . . . | 2 | 3 | » |
| * Riccardi . . . . . . . . . . | » | 5 | » |
| Richardsoni (d'Amérique) . . . . | » | 5 | » |
| * Rives nova (China) . . . . . . | 2 | 3 | » |
| * Rose Agathe. . . . . . . . . . | 3 | 10 | » |
| * rasæflora . . . . . . . . . . | 2 | 3 | » |
| * Rosamunda . . . . . . . . . | 2 | 5 | » |
| rosea punctata . . . . . . . . | » | 3 | » |
| * Rouvroy . . . . . . . . . . | » | 4 | » |
| * rubicunda. . . . . . . . . . . | » | 3 | » |
| * plena (A. B.) . . . . . . . | 2 | 3 | » |
| rubra maxima. . . . . . . . . | » | 2 | » |
| * rubricaulis variegata. . . . . . | 1 | 4 | » |
| †* Sacco Limatensis . . . . . . | 2 | 8 | » |
| * **Sarah Frost**, d'Amérique . . | » | 10 | » |
| * scintilans . . . . . . . . . . | 2 | 5 | » |
| * Scottiana . . . . . . . . . . | 2 | 3 | » |
| †* sericea . . . . . . . . . . | 2 | 3 | » |
| * Sieboldii (imbricat. tricol.) . . . | 3 | 4 | » |
| * Sinica . . . . . . . . . . . | » | 3 | » |
| * Smith's amabilis . . . . . . . | » | 2 | » |
| * grandiflora . . . . . . . | 2 | 4 | » |
| * speciosa . . . . . . . . . . | 2,50 | à 10 | |
| * Saint-George . . . . . . . . | | 25 | » |
| * Sweetiana (A. B.) . . . . . . | 2 | à 5 | » |
| * Taylori. . . . . . . . . . . . | 2 | 5 | » |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| * **Camellia** jap. Theresiana (A. B.) | 2 à 5 » |
| Teutonia | 2 10 » |
| * Traversi mutabilis | 2 5 » |
| Triphosa lactea (F. B.) | 2 4 » |
| † triumphans | 2 4 » |
| * variegata chinensis | 2 6 » |
| * plena (A. B.) | 2 3 » |
| * venusta (A. B.) | 2 4 » |
| * verecunda | 4 10 » |
| * atroviolacea | » 5 » |
| * Vesuvius | » 3 » |
| † Victor Hugo | » 7 » |
| * virginica | 2 6 » |
| Wardii | 2 3 » |
| * **Washingtoniana**, nouvelle d'Amérique | 4 15 » |
| * Watsoniana | 2 3 » |
| Welbanksiana heptangularis | 3 4 » |
| * Wirkafeld | 4 10 » |
| †* Woodsi (A. B.) | 3 6 » |
| * Kissi (DC.) | » 2 » |
| * reticulata (Lindl.) | 3 6 » |
| Sassangua rosea plena | 2 3 » |
| * nepalensis | » 4 » |
| * oleifera (Abel) | 2 3 » |
| * lalifolia | 2 3 » |
| Thea Bohea | 2 3 » |
| camellioides | 3 » |
| sassangua | 3 » |
| viridis (Green Thea) | 2 à 4 » |
| **Campanula** Barkeri? | » 50 |
| fragilis (Cyril.) | » 50 |
| laciniata (Lin.) | » 50 |
| verna | » 50 |
| **Candolea** cuneiformis (Labil.) | » 75 |
| Cunninghami | 1 » |
| **Cassiope** tetragona (G. Don.). *Andromeda tetragona* | 5 » |
| **Castanospermum** australe (Cunn.) | 6 » |
| **Casuarina** stricta (Willd.) | 1 » |
| species nova | 5 » |
| **Ceanothus** azureus (Desf.) | 1 » |
| divaricatus | » 50 |
| **Celastrus** buxifolia | 1 » |
| edulis | 1 » |
| **Cestrum** grandiflorum (Hort.) | 1 » |
| roseum (H. B.) | 1 » |
| **Chamœrostenum** polyanthum? | » 50 |
| **Chasmone** Andrewsiana (E. M.) | 1 » |
| **Chironia** Fischeri | 1 » |
| linoides (L.) | 1 » |
| trinervis (Lin.) | 1 » |
| **Chorizema** ilicifolium (Labill.) | 1 » |
| triangularis | 3 » |
| varium | 1 » |
| 12 *plantes florifères* | 6 » |
| novum | 1 » |
| **CINERARIA.** *Une collection de premier choix de 12 variétés bien assorties* | 9 » |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Cineraria.** *Une collection de second choix* | 5 » |
| **Citrus** aurantiacum chin. longifol | 3 » |
| nobilis, Or. douce | 1 à 8 » |
| latifolia foliis variegatis | 1 50 à 2 |
| longifolia variegatis | 1 à 2 » |
| lunatum (Ris.), Or. turc | 1 2 50 |
| Marocco | 1 2 » |
| Otahitense (Ris.) | 1 3 » |
| Portugallo vanigla | 1 2 » |
| Tangerin | 1 3 » |
| Tipain | 1 3 » |
| australis | 1 3 » |
| Bergamia melarosa | 1 3 » |
| bastardo | 1 3 » |
| flore pleno | 2 » |
| merveille d'Espagne | 1 50 à 3 |
| du Pérou | 1 50 |
| Bigaradia crispifolia. *Bouquetier* | 1 à 2 » |
| Japonica | 1 3 » |
| foliis aureo variegatis | 1 8 » |
| hystrix (DC.) | 1 4 » |
| Limetta Pomum Adami. Cedra des juifs | 1 4 » |
| scanellatone | 1 3 » |
| Limonium balotinum (Ris.) | » 2 » |
| chinense | 1 3 » |
| digitatum | 1 50 à 3 |
| dolce | 1 à 3 » |
| foliis integris | 1 3 » |
| grossa della Regina | » 3 » |
| longo puncto. *C. unbellicato* | 1 4 » |
| moscardina | 2 » |
| à suc noir | 2 » |
| monstrosum | 1 à 3 » |
| Peretto domingensis | 2 50 |
| Pompelmus Chadec. à feuilles velues | 1 à 3 » |
| de Portorico, nouvelle variété | 5 » |
| rubescens | 1 à 4 » |
| striatum, scanellatum | 1 à 3 » |
| striatum foliis variegatis | 3 » |
| stricta C. buxifolia | 1 à 2 » |
| trifoliata | 1 à 3 » |
| *Une collection de 25 variétes diverses à mon choix* | 25 » |
| 20 *variétés en greffes de 2 ans, au choix des amateurs* | 30 » |
| **Cheirostemum** platanoides (H. et B.) | 3 » |
| **Clethra** arborea (Ait.) | 1 » |
| foliis variegatis | 1 50 |
| maderiensis | 1 » |
| mexicana | 2 » |
| **CLIANTHUS FORMOSUS, nouveau** | 20 » |
| puniceus (Soland.) | 1 à 3 » |
| **Correa** alba (DC.) | » 50 |
| 25 *jeunes plantes propres à la greffe* | 10 » |
| bicolor | 1 » |
| Grevillii | 1 » |
| longifloro | 1 à 4 » |
| nec plus ultra | 6 » |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Correa** quadrangularis | 50 c. à 4 f. |
| rosea multiflora | 1 50 à 4 |
| rubra major | 2 » |
| rufa (Gœrtn.) | » 50 |
| speciosa (And.) | 1 à 2 » |
| speciosissima | 1 à 2 » |
| Stockwelliana | 2 » |
| tricolor | 4 » |
| viridiflora (Andr.) | 50 c. à 2 f. |
| **Coronilla** glauca foliis variegatis | 1 » |
| **Cratægus** glabra | 1 » |
| serratifolia | 1 50 |
| species nova à feuilles persistantes, très-grande et belle plante | 2 » |
| **Crotallaria** elegans | 1 » |
| **Cuphea** cordata | 1 à 2 » |
| decandra | 1 » |
| miniata | » 50 |
| platicentra | » 50 |
| scabrida (H. B.) | » 50 |
| strigulosa | » 50 |
| viscosa | » 75 |
| **Cussonia** spicata (Thunb.) | 2 » |
| thyrsiflora (Thunb.) | 1 50 |
| **Cyclamen** africanum | 4 à 20 » |
| intermedium | 1 » |
| neapolitanum (Ttn.) | 1 » |
| persicum (Mill.) | 75 c. à 1 f. |
| **DACRIDIUM.** *Voyez* **Conifères.** | |
| **Dais** cotinifolia (L.) | 1 » |
| **Damara.** *Voyez* **Conifères.** | |
| **Daphne** Aucklandi | 2 à 3 » |
| Cneorum maximum | 1 à 1 50 |
| foliis variegatis | 1 50 |
| collina (W.) | 1 à 2 » |
| Delahayana | 2 » |
| Fioni, Daphne Delphini | 1 à 3 » |
| indica foliis variegatis | 1 à 2 » |
| flore rubra | 3 » |
| neapolitana (Lodd.) | 1 à 2 » |
| odora (Thunb.) | 2 » |
| pontica (Spr.) | 1 » |
| **Dasylirion** filiforme | 5 à 10 » |
| angustifolium | 5 à 10 » |
| latifolia nova | 40 » |
| species du Mexique | 30 » |
| **Datura** arborea (L.). *Brugmansia candida* (Pers.) | 1 à 6 » |
| **Diosma** angustifolia (Hort.). *Coleonema pulchra* (Hook.) | 1 » |
| cordata (Hort.) | 1 » |
| dioica | 1 » |
| formosa | 1 » |
| fragrans | 1 » |
| grandiflora | 1 » |
| purpurea (Hort.) | » 50 |
| umbellata (W.) | 1 » |
| uniflora (Schrad.) | 1 » |
| **Diplolena** Dampierii | 1 à 3 » |
| **Dodonea** pinnata (Sm.) | 1 à 2 » |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Dombeya** Erythroxylon (Willd.) *Melhania Erythroxylon* | 3 » |
| **Dorianthes** excelsa (R. R.), *très-fort* | 10 à 25 |
| **Droemandra** floribunda | » 50 |
| **Dryandra** floribunda (R. Br.) | 10 » |
| formosa (R. Br.) | 10 » |
| longifolia (R. Br.) | 10 » |
| nivea (R. Br.) | 10 » |
| tenuifolia (R. Br.) | 10 » |
| **Eleodendron** orientale | 6 » |
| **Elichrysum** argenteum (Th.) | 1 » |
| fulgidum (Willd.) | 1 » |
| proliferum. *Phœnocoma prolifera* (D.) | 1 à 3 » |
| spectabile | 1 » |
| **Embothrium** speciosissimum | 10 à 50 |
| **Embryopteris** glutinifera (Rox.) *Diospyros Embryopteris* (Spreng.) | 3 à 5 » |
| **Enkianthus** longifolius | 8 à 10 |
| quinqueflorus (Lour.) | 5 à 12 |
| **Epacris** amabilis | 5 » |
| campanulata (Lodd.) | 1 à 6 » |
| alba | 4 » |
| coccinea | 8 » |
| crassifolia | 3 à 8 » |
| elegans | 5 à 8 » |
| heteronema (Labill.) | 1 » |
| grandiflora (Sm.) | 1 à 4 » |
| impressa (Labill.) | 2 à 3 » |
| lævigata | 5 » |
| mucronulata (R. P.) | 2 » |
| nivalis (Grah.) | 2 à 4 » |
| onosmæflora (Cun.). *Lysineme ruscifolia* (Sieb.) | 1 à 5 » |
| palludos | 1 » |
| pulchella (Sieb.) | 2 » |
| major | 2 » |
| variabilis (Lodd.) | 3 » |
| **Erica** amœna (Wendl.) incarnata | 1 50 |
| arborea (L.) | 1 » |
| Archeria (Andr.) | 2 50 |
| Australis (L.) | 1 50 |
| Banksii purpurea | 2 » |
| Blanda | 2 » |
| Calycina (L.) | 1 » |
| cerinthoides (L.) | 3 » |
| colorans (Andr.) | 2 » |
| concinna (Ait.) | 1 » |
| concolor (Lood.) | 1 » |
| corsica | 1 » |
| costata superba | 1 » |
| cubica (L.) | 1 » |
| minor (B.) | 1 » |
| cupressina | 1 » |
| cylindrica superba (Hoffms.) | 2 » |
| equatiformis? *comme persoluta rubra* | 1 » |
| 12 *plantes de* 10 *à* 12 *cent.* | 6 » |
| exigua (Salisb.) | 1 » |
| filamentosa (Andr.) | 1 » |
| floribunda | 1 » |
| glandinosa? | 1 » |

| *La pièce.* | fr. c. |
|---|---|
| **Erica** Hibbertia (Andr.) | 1 50 |
| hybernica var. *de Mediterranea* | 1 50 |
| hyemalis | 1 à 2 » |
| ignescens (Andr.) | 1 à 2 » |
| intervallaris | 1 à 3 » |
| laniflora (Wendl.) | 1 50 |
| Linnea varietas | 1 50 |
| longipes | 1 à 2 » |
| mammosa (L.) | 1 à 2 » |
| coccinea | 2 » |
| major | 1 » |
| mediterranea (L.) | 1 » |
| Monsoniæ (L.) | 2 » |
| montana (Bedf. E.) fabrilis (Salisb.) | 1 » |
| multiflorum anglorum (Hort.) | 1 » |
| oppositifolia (A. H.) | 1 » |
| Ottois (Hort.) | » 50 |
| passerina (L.) | 1 » |
| persoluta alba (L.) | 1 50 |
| petiveriana | 2 » |
| Pluckneti | 1 » |
| polytrichifolia (Salisb.) | » 50 |
| præstans (Andr.) | 1 » |
| pulchella (Andr.) | 1 » |
| regerminans (L.) | » 50 |
| rubens (Andr.) | 1 50 |
| ruber calix | 2 » |
| Sebana lutea | 2 » |
| triflora | |
| sexfaria | 2 à 3 » |
| socciflora (Salisb.). Sebana viridis (A. H.) | 3 » |
| speciosa (Andr.) | 2 » |
| suaveolens | 2 » |
| sulphurea | 2 » |
| Tetralix speciosa (Hort.) | 1 » |
| translucens rubra | 3 » |
| transparens | 3 » |
| ventricosa (Th.) | 1 » |
| purpurea | 1 » |
| stellata | 1 50 |
| verticillata | 3 » |
| vestita | 4 » |
| *Une collection de* 25 *espèces à mon choix* | 20 » |
| **Eucomis** nana | 3 » |
| **Eutaxia** Baxteri (K. et W.) | 1 50 |
| myrtifolia (R. Br.) | 1 50 |
| **Excoecaria** tinifolia (Swartz.) | 1 50 |
| **Fabiana** imbricata (R. P.) | 1 25 |
| **Fabricia** lævigata (Sm.) | 1 50 |

**FUCHSIA.**

| | |
|---|---|
| Amata | » 50 |
| Armide | 1 » |
| Chinois | » 50 |
| Clara | » 50 |
| corymbiflora (R. B.) | 75 c. à 3 |
| défiance | » 50 |
| Dezemii (Baumann), *belle fleur très-grande* | 1 » |

| *La pièce.* | fr. c. |
|---|---|
| **Fuchsia** Doctor Jephson | 1 50 |
| Duchesse of Sutherland | 1 » |
| Emperor (Harrisson) | 1 » |
| Esmeralda (Miellez) | 1 » |
| Estella | 1 » |
| Fanny Esler (Miellez) | 1 » |
| Fairy Rosamunda (Harrisson) | 1 » |
| formosissima | 1 » |
| fulgens (R.) | 50 c. à 3 |
| Gabrielle d'Estrée | 1 50 |
| gigantea | 1 » |
| Joan of Arc (Miellez) | 1 » |
| Juno | » 50 |
| London's rival (G. Smith.) | » 50 |
| magnet (Regel's) | 1 » |
| Napoléon (Miellez) | » 50 |
| nymphe | 1 » |
| Prince of Wales | 1 » |
| Queen Victoria | 1 50 |
| racemiflora | 1 » |
| Rebecca | 1 » |
| Robert | » 50 |
| Rogersiana | » 50 |
| Rosa mundi | 1 » |
| scaramouche | » 50 |
| Venus victrix | 1 » |
| *J'offre en outre, à mon choix:* | |
| Une collection de **Fuchsia** de 12 esp. | 6 » |
| » » de 24 » | 15 » |
| » » de 30 » | 20 » |
| *Au choix des amateurs :* | |
| 12 espèces | 12 » |
| 24 » | 20 » |
| **Gardoquia** betonicoides | 1 » |
| Hookeri (Benth.) | 1 » |
| **Gastrolobium** vimineum | 1 » |
| **Gaultheria** mexicana? | 5 » |

**GERANIUM ou PELARGONIUM.**

NB. *Variétés tirées des meilleures sources pour ce beau genre et offrant toutes les fleurs du premier ordre.*

| | |
|---|---|
| **Gordonia** Lasianthus L. | 3 » |
| **Grevillea** acanthifolia (Sieb.) | 2 » |
| Baueri (R. Br.) pubescens (Hook.) | 1 » |
| bipinnatifida | 6 » |
| ferruginea (Sieb.) | 1 50 |
| Lawrenceana | 2 » |
| Manglesii (Hort.). *Manglesia cuneata* (Endl.) | 1 » |
| robusta (Cunn.) | 2 à 3 » |
| rosmarinifolia (Cunn.) | 1 » |
| sericea | 5 » |
| sulphurea (Cunn.) | 1 » |
| Thelemaniana (Hug.) | 1 50 |
| vestita | 3 » |
| **Hakea** Baxteri (R. Br.) | 1 50 |
| ceratophylla (R. Br.) | 1 50 |
| flexilis (R. Br.) | 2 » |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Hakea** Lambertii (Sweet.) | 1 50 |
| palmata | 2 » |
| pugioniformis (Cav.) | 1 50 |
| species de Swan River | 15 » |
| **Hovea** pungens | 5 à 8 » |
| purpurea | 3 à 5 » |
| **Houstonia** coccinea (Andr.) | 1 » |
| **Hydrangea** Hortensis (DC). Hortensia | 1 à 3 » |
| moyenne force | 2 » |
| forte plante | 2 » |
| cœrulea | 1 50 |
| forte plante | 5 » |
| japonica | 1 à 3 » |
| **Hydrolea** spinosa (Lin.), *aquatique* | 2 à 4 » |
| **Hypericum** japonicum (Thunb.) | 2 » |
| **ILEX** excelsa | |
| **LATIFOLIA** (Thunb.) | 2 à 8 » |
| **Illicium** anisatum (L.) | 1 50 |
| floridanum (L.) | 1 50 |
| religiosum | 2 à 3 » |
| **Indigofera** verucosa | 1 » |
| **Isopogon** formosus | 2 » |
| **Isotoma** axillaris (R. Br.) | 1 » |
| **Jasminum** azoricum (L.) | 1 » |
| grandiflorum (L.) | 1 » |
| nepalense (Spr.) | 1 » |
| heterophyllum (Wall.) | 1 » |
| odoratissimum (L.) | 1 » |
| Wallichianum (Lindl.) | 1 50 |
| **Lalage** ornata | 20 » |
| **Lambertia** echinata (R. Br.) | 2 à 4 » |
| formosa (Sm.) | 1 50 à 3 |
| propinqua (R. Br.) | 1 à 3 » |
| **Laurus** camphora (L.) | 2 à 4 » |
| caroliniensis (Mich.) | 1 50 |
| fœtens (Ait.) | 2 » |
| glaucophylla ? | 2 » |
| indica (Linn.) | 3 » |
| involucrata (Heb.) | 2 » |
| nobilis (L.) | 2 » |
| salicifolia | 2 » |
| foliis variegatis | 2 » |
| Persea (L.). Persea gratissima (Gœrt.) | 10 » |
| tomentosa | 2 » |
| **Leschenaultia** biloba | » 50 |
| multiflora | 1 75 |
| drumondi | 1 » |
| formosa (R. Br.) | » 75 |
| laricifolia | 2 » |
| oblata | 1 » |
| splendens | 2 à 5 » |
| **Leucothoe** buxifolia (DC.). Andromeda buxifolia | 1 à 3 » |
| **Linaria** triornitophora | 1 50 |
| **Liparia** sphærica | 2 » |
| **Lithospermum** rosmarinifolium (T.) | » 50 |
| **Lobelia** Erinus (L.) | 1 » |
| Richardsonii | 2 » |
| Surinamensis | 1 50 |
| **Lomatia** ilicifolia (R. B.) | 4 » |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Lomatia** longifolia (R. Br.) | 1 50 |
| silaifolia (R. Br.) | 3 à 6 » |
| **Magnolia** fuscata (Andr.) | 1 à 4 » |
| grandiflora (L.) | 2 50 |
| 12 *jeunes plantes pour la greffe* | 7 50 |
| Biquelin | 3 » |
| canaliculata | 2 » |
| Exmouth | 4 » |
| glabra ovata | 4 » |
| **HARTWIGUS**, *hybride du* pumila *et* grandiflora, *nain et multifiore* | 6 » |
| latifolia | 4 » |
| oxoniensis | 2 » |
| præcox | 4 » |
| pumila (Andr.) | 2 à 4 » |
| rotundifolia | 3 » |
| undulata | 2 » |
| **Malva** lateritia | 3 » |
| **Manglesia** Drumondi | 1 50 |
| **Melaleuca** calycina (R. Br.) | 1 » |
| decussata (R. B.) | 1 « |
| fulgens (R. Br.) | 1 » |
| ovata (Hort.) | 1 » |
| pulchella (R. Br.) | 1 » |
| species N° 2 Swanriver | 3 » |
| N° 3 » | 3 » |
| **Menispermum** laurifolium (Roxb.). Cocculus laurifolius (DC.) | 1 » |
| Mespilus japonica (Willd.) | 1 à 2 » |
| **Metrosideros** præcox | 1 à 3 » |
| ruscifolia | 1 » |
| semperflorens (Lodd.) | 1 » |
| **Mimulus** guttatus fulgens | 1 » |
| eximius | 1 50 |
| **Mirbelia** ilicifolia. *M. undulata* | 1 à 6 » |
| **Monsonia** filia ? | 1 » |
| lobata (Ait.) | » 75 |
| speciosa | 1 » |
| **Moræa** iridoides (L.). *Iris moræoides* (Ker.) | 1 » |
| **Myrtus** bullata (Salisb.) | 2 à 10 » |
| communis (L.) | 1 à 8 » |
| foliis variegatis | 1 à 6 » |
| romana | 1 à 8 » |
| horizontalis (Vent.). *Eugenia disticha* | 1 à 2 » |
| mucronata (Pers.) | 1 » |
| torentina (Mill.) | 1 » |
| **Nerium** oleander (L.) | 1 » |
| flore albo pleno | 1 50 |
| album niveum | 1 50 |
| atropurpureum odoratissimum | 1 50 |
| aurantiacum | 2 » |
| cardinalis flore pleno | 1 50 |
| coccineum | 1 » |
| elegans | 1 » |
| Foncolombinum, *double blanc* | 2 » |
| grandiflorum pleno | 1 50 |
| Jeanne d'Arc | 1 50 |
| lacteolum | 1 » |
| Lesieuri plena | 2 » |

| La pièce. | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Nerium** Mabiri | 1 | » |
| maculatum plena | 1 | » |
| pumilum *luteum* | 2 | » |
| punctatum plenum | 2 | » |
| purpureum plena | 1 | » |
| coccineum | 2 | » |
| Quellenii flore pleno | 2 | » |
| Richardsoni | 1 | » |
| salicifolium | 2 | » |
| spectabilis de Neuilly | 1 | » |
| foliis variegatis | 3 | » |
| superbum | 1 | » |
| tinctorium | 1 | » |
| vittatum | 1 | 50 |
| splendens flore pleno | 2 | » |
| foliis variegatis | 2 | 50 |
| **Nymphæa** cœrulea (W.) | 3 | » |
| **Olea** europæa (W.) | 1 | » |
| buxifolia | 1 | » |
| fragrans (Thunb.) | 1 | » |
| **Oxalis** Bovii (Lodd.) | 1 | » |
| reptatrix (Jacq.) | » | 50 |
| rosea (Jacq.), floribunda (B. R.) | » | 50 |
| pectinata (Jacq.) | » | 50 |
| **Penstemon** primuloides, P. mexican. | » | 50 |
| **Petrophila** pedunculata (R. Br.) | 2 | » |
| pulchella (R. Br.) | 3 | » |
| **Petunia** Apollo | 1 | » |
| Beauté du jour, *pourpre brillant* | 1 | 50 |
| Beauty Sophia | 1 | » |
| conservation | » | 50 |
| delicatissima | 1 | » |
| Donald | 1 | » |
| Frédéric II | 1 | 50 |
| Général Tom Pouce, *petite mignature* | 1 | » |
| ma favorite, *blanc strié de pourpre* | 1 | » |
| maxima | 1 | » |
| Melpomène, *pourpre brillant, g. fl.* | 1 | » |
| mon Henry, *rose strié de blanc en œillet* | 2 | » |
| mignonne, *blanc, centre strié* | 1 | » |
| Pagina Maria | 1 | 50 |
| Princesse Léopoldine | 1 | 50 |
| Princesse Sophie | 1 | » |
| Queen of the May | 1 | » |
| Superbe | 1 | » |
| **Phlox** Drummondi (Hook.) | 1 | » |
| Donkelari | 1 | » |
| **Phormium** tenax (Forst.) | 1 | 50 |
| **Photinia** lævis. *Ph. lævigata* | 1 | 50 |
| serrulata (Lindl.) | 1 | 50 |
| **Phylica** paniculata (Willd.) | 2 | » |
| rosmarinifolia (Lam.). Soulangia axillaris (Brogn.) | 1 | » |
| **Phyllocladus.** *Voyez les Conifères.* | | |
| **Physianthus** albens (Mart.). Araujа calycina (DC.) | 2 | » |
| **Pimelea** drupacea (Labill.) | » | 50 |
| decussata rubra | 1 | » |
| hypericina (Hook.) | 1 | » |
| **Pimelea** mirabilis | 3 | » |
| nivea (Babill.) | 2 | » |
| spectabilis | 1 | 50 à 4 |
| sylvestris (R. Br.) | 2 | » |
| **PINCKNEYA pubens** (Pers.) | 5 | » |
| **Pinus.** *Voyez les Conifères.* | | |
| **Pittosporum** discolor ? | 1 | 50 |
| revolutum | 2 à 3 | » |
| sinense (Desf.) | 1 | » |
| Tobira (Ait.) | 1 | » |
| foliis variegatis | 2 | » |
| **Podocarpus.** *Voyez les Conifères.* | | |
| **Poinciana** Gillesi | 1 à 3 | » |
| **Polygala** broboniæfolia (Burch.) | 2 | » |
| cordifolia (Thunb.) | 1 | » |
| Dalmaisiana | 1 à 3 | » |
| grandiflora (B. C.) | 1 | 50 |
| Heisteria (L.). Muraltia (Heist.) | 1 | » |
| latifolia (Br.) | 1 | 50 |
| speciosus (Sims.) | 1 | » |
| Zeyheri (Spreng.) | 2 | » |
| **Porleria** hygrometrica (Ruiz et Paw.) | 1 | 50 |
| **Primula** chinensis (Lour.) | 1 | » |
| flore albo | 1 | 50 |
| pleno | 2 à 6 | » |
| rubro pleno | 6 à 10 | » |
| Palinuri (R. B.) | 2 | » |
| **Prostantheria** rotundifolia (R. Br.) | 1 | 50 |
| violacea (R. Br.) | » | 50 |
| **Protea** coccinea | 6 | » |
| conferta | 3 | » |
| cordata | 10 | » |
| cynaroides | 4 à 8 | » |
| insignis | 6 | » |
| nerifolia | 5 | » |
| pallens (Linn.) | 2 | » |
| pinifolia (L.). Aulax pinifolia (Berg.) | 4 | » |
| plumosa (Ait.) | 5 | » |
| saligna (L.) | 3 | 50 |
| speciosa rubra | 5 | » |
| umbellata | 4 | » |
| **Psorophytum** undulatum (Spach) | 3 | » |
| **Pultenæa** flexilis (DC.) | 1 | 50 |
| retusa (Sm.) | 1 | 50 |
| subumbellata (Hook.) | 1 | » |
| tenuifolia (R. Br.) | 1 | » |
| **Punica** granatum (L.) | 1 | » |
| sujets en tige | 6 à 10 | » |
| lutea | 1 à 3 | » |
| flore pleno | 2 | » |
| sujets en tige | 5 à 25 | » |
| nana | 1 | 50 |
| prolifera | 1 | 50 |
| **Quercus** glabra, du Mexique | 10 | » |
| rugosa (Nec.) | 3 | » |
| **Rapiholepis** salicifolia | 1 | » |
| **Rhexia** elegans ? | 1 | » |

**RHODODENDRON**

| | | |
|---|---|---|
| Arboreum | 2 à 8 | » |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Rhodod.** arboreum album (Bot. Reg.). | 3 à 4 » |
| acuminatum. | 5 à 10 » |
| augustum (M.). | 4 » |
| Batterseanum | 4 » |
| Burggravianum | 2 » |
| Catherine II (M.) | 3 » |
| Chelsonii | 2 à 3 » |
| cinerea | 2 » |
| **Clito** | 3 » |
| cunninghami album | 5 » |
| cuprum | 3 » |
| diadematum | 3 » |
| Drummondi | 4 » |
| electum | 2 à 3 » |
| elegans | 2 à 3 » |
| Emilie (M.). | 3 » |
| fulgens | 3 » |
| **Forkelli** | 4 à 15 » |
| Fromontianum (M.) | 2 à 6 » |
| Grand duc de Baden | 3 » |
| grandissimum | 4 » |
| **Hæmmerlini** | 5 à 20 » |
| Impératrice Joséphine | 3 à 6 » |
| **Joschti** | 6 à 25 » |
| Ketleri (M.) | 3 » |
| Lady Warender (M.) | 4 » |
| Brougham | 4 » |
| Lexoviensis (M.). | 3 à 8 » |
| macranthum | 4 à 5 » |
| magniflorum | 2 » |
| magnoliæfolium | 2 à 4 » |
| **Marshal Wilder** | 4 » |
| **Mulleri** | 6 » |
| **Muzianum** | 4 » |
| nivaticum | 3 » |
| niveum | 2 à 3 » |
| Nobilianum | 3 » |
| **Neumannii** (Nob.). | 5 à 10 » |
| **Octavie Morel** (M.) | 8 » |
| **Ottoi** | 10 » |
| pallidum. Rh. Carraciolï (B.). | 2 à 4 » |
| phœniceum | 4 » |
| **Prince de Joinville** | 8 » |
| pulchrum | 3 » |
| **Queen Victoria** | 4 à 10 » |
| **Rochetuilé (Cam. de)** | 4 » |
| rubicaulis | 2 à 4 » |
| rubrum pallidum | 2 à 5 » |
| violaceum | 2 à 3 » |
| rugosum (M.). | 4 » |
| Russelianum | 3 » |
| Smithii (M.) | 5 à 10 |
| album | 3 » |
| elegans (M.) | 3 » |
| Stephani (Grande-Duchesse) | 4 » |
| strictum | 4 » |
| superbum (M.) | 3 à 8 » |
| Triumphans (M.) | 3 » |
| Triomphe d'Anvers | 3 » |
| venustum | 10 à 20 |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| **Rhododendron** arboreum victory | 3 à 5 » |
| Wiltoni | 3 » |
| Altaclarense (Lindl,) | 2 a 5 » |
| campanulatum (Wall.) | 3 à 10 » |
| Alexandrinum | 5 » |
| latifolium | 5 » |
| macrophyllum | 5 » |
| speciosum | 5 » |
| Tarreri, *Rh. reticulatum* | 4 » |
| Gowenianum (B. F. G.) | 3 à 8 » |
| Gypsoni | 5 à 10 » |
| Norbertianum | 5 à 8 » |
| *Une collection de* Rhododendron arboreum *de* 15 *variétés à mon choix, greffés d'un an sans boutons* | 15 » |
| *Une collection de* 15 *espèces et variétés, à mon choix, greffés de deux ans. Forts, avec boutons* | 30 » |
| *Des individus forts, d'un à deux mètres.* | 4 à 25 » |
| **Ribes** albidum | 1 50 |
| du Chili, nouveau | 2 » |
| **Ruellia** azurea | » 50 |
| **Salvia** azurea (Lam.) | 1 » |
| cardinalis (Humb.) | » 50 |
| confertiflora | 2 » |
| eriocalix | 1 » |
| Grahami (DS.) | » 50 |
| patens (Cav.) | 1 » |
| splendens (Ker.) | 1 » |
| tricolor var. s. officinalis | » 50 |
| **Scutellaria** splendens (Link.) | 1 » |
| **Selago** Gillii (Bot. Reg.) | 1 50 |
| **Sempervivum** arboreum | 1 50 |
| tabulæformis | 3 » |
| **Siphocampylus** betulæfolius | 1 » |
| bicolor (Sims.) | 1 » |
| duplo serratus | 1 50 |
| lantanifolius | 1 » |
| longipeduncnlatus | 1 » |
| **Sphænotoma** squarrosum | 3 à 10 » |
| **Spigelia** nova ceylanica | 1 à 1 50 |
| **Statice** arborea (Brouss) | 4 à 25 » |
| Dicksonia | 3 à 5 » |
| grandiflora (Hérit.) | 1 50 |
| monopetala (Linn.) | 1 50 |
| **Stevia** Lindleyana | 1 » |
| **Styphelia** tubiflora (Smith.) | 3 » |
| viridiflora | 1 » |
| **Stylidium** adnatum (R. B.) | 1 » |
| androsaceum | 2 » |
| coccineum | 1 50 |
| **Swainsonia** coronillæfolia fl. rubra | 1 75 |
| **Taxus.** *Voyez les connifères.* | |
| **Templetonia** retusa (R. Br.) | 2 » |
| glauca (Sims.) | 1 50 |
| species nova? | 10 » |
| **Tetranema** mexicana. *Penstemon primuloides* | » 50 |
| **Thea** camellioides | 3 » |
| Bohea (Linn.) | 2 » |

| La pièce. | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Thea** sassangua | 2 | » |
| viridis (Linn.) | 2 | » |
| **Thermopsis** laburnifolia (Don.) | 2 | » |
| **Tremandra** floribunda | » | 50 |
| **Tristania** laurina (R. Br.) | 2 | » |
| neriifolia (R. Br.) | 2 | » |
| **Ulex** hybernicus (DS.) | 1 | » |
| nepalensis | 1 | » |
| **VERBENA** | | |
| alba grandiflora | 1 | » |
| Anaïs | » | 50 |
| Andromaque | » | 50 |
| atropurpurea | » | 50 |
| azureum grandi florum | » | 75 |
| Barkeri | » | 50 |
| Beauté suprême, *rose superbe* | 1 | » |
| bicolor *odorata* | » | 50 |
| Brawni | » | 50 |
| Comte de Paris, *magnifique* | 1 | » |
| Corbelli | 1 | 50 |
| Currati (Baumann's), *couleur plus vive que* fine scarlet | 2 | » |
| Drumondi | 1 | » |
| Duchesse d'Orléans, *rose, centre blanc superbe* | 1 | » |
| Empereur du Maroc | 1 | » |
| fine scarlet | » | 75 |
| Gœthe (Baumannis) | 2 | » |
| Ignea, *écarlat vif* | 1 | 50 |
| Impératrice Joséphine, *bleu superbe* | 1 | 50 |
| magniflora | 1 | » |

| La pièce. | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Verbena** Musiana | » | 50 |
| nec plus ultra | » | 50 |
| Paul | » | 50 |
| Teucrioides atrosanguinea | 1 | » |
| violet superbe | 1 | » |
| Voltaire | | |
| Wonder of scarlet (Irrey) | » | 75 |
| *Une collection de* 20 *Verbena bien assortis* | 9 | » |
| *Plus une collection de* 15 *variétés à mon choix* | 6 | » |
| *Une collection de* 30 *variétés à mon choix* | 15 | » |
| **Veronica** salicifolia | 2 | » |
| speciosa | 1 à 1 | 50 |
| **Viburnum** dentatum (L.) | 1 | 50 |
| japonicum | 3 | » |
| odorantissimum (Ker.) | 2 | » |
| Tinus (W.) | 75 c. à 5 f. | |
| foliis variegatis | 1 à 8 | » |
| **Yucca** aloifolia (L.) | 4 | » |
| foliis variegatis | 4 à 40 | » |
| flaccida (Haw.) | 1 | 50 |
| glaucescens (Haw.) | 2 | » |
| gloriosa (L.) | 2 | » |
| recurva (Salisb.) | 3 | » |
| **Zieria** trifoliata (Sm.) | 1 | » |
| 1° *Une collection de* 50 *plantes, en* 50 *espèces, à mon choix* | 20 | » |
| 2° *Une collection de* 75 *plantes, en* 75 *espèces* | 40 | » |
| 3° *Une collection de* 100 *plantes, en* 100 *espèces* | 60 | » |

## PLANTES GRIMPANTES DE SERRE CHAUDE, TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

| La pièce. | fr. | c. |
|---|---|---|
| *Les espèces marquées d'un* * *sont pour serre chaude.* | | |
| **Acrophyllum** *venosum* | 3 | » |
| * **Æchynanthus** atropurpurea | 1 | » |
| Boschianus | 2 | » |
| * grandiflora (Spr.). Iucarvillea perasitica (Roxb.) | 1 | 50 |
| * Lobbianus | 3 | » |
| * Paxtoni | 3 | » |
| * ramosissimus | 1 | » |
| * Roxburghii. *A. macrophyllus* | 2 | » |
| **Alstroemeria** acutifolia (M.) | 2 | » |
| **Argyrea** nervosa | 10 | » |
| * **Aristolochia** barbata (Jacq.) | 2 | » |
| Gigas | 1 | 50 |
| * labiosa (Ker.) | 2 | » |
| * saccata | 1 à 4 | » |
| sempervirens | 1 | » |
| **Arum** auriculatum | 3 | » |

| La pièce. | fr. | c. |
|---|---|---|
| * **Asclepias** carnosa (L.). *Hoya carnosa* (R. B.) | 1 à 2 | » |
| * coccinea | 2 à 3 | » |
| * pendula | 3 | » |
| * **Banisteria** tenuis | 1 | 50 |
| * argentea | 5 | » |
| **Basella** tuberosa, *Bousingaultia basselloides* | » | 50 |
| **Batatas** betacea. *Ipomea Humboldtii* | 1 | » |
| Wildenowi | 1 | » |
| **Bauersia** maculata (M.) | 2 | » |
| * **Beaumontia** grandiflora | 2 | » |
| * **Bauhinia** macrophylla (M.) | 10 | » |
| **Bignonia** capensis | 1 | » |
| capreolata (L.) | 1 | » |
| heterophylla (W.). Kereri (Aubl.) | 2 | » |
| jasminifolia (H. B.) | 1 | » |
| Pandorana | 2 | » |
| speciosa | 1 à 2 | » |

| La pièce. | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Bignonia** Tweedeana | 1 à 2 | » |
| * venusta. *Tecoma venusta.* | 2 | » |
| * **Bougainvillea** spectabilis (Willd.). | 1 à 3 | » |
| * **Brugmansia** floribunda. *Juvanuloa aurantiaca* | 2 | » |
| **Cadsura** japonica (Van Siebs). | 1 | 50 |
| **Cajophora** lateriata (*Loasa*). | » | 50 |
| **Candollea** Cuninghami (Hort.) | 2 | » |
| * **Ceropegia** elegans (Hook.) | 1 | » |
| * africana (R. B.) | 1 | » |
| **Chorizema** cordatum (Lindl.) | 1 | » |
| illicifolium | 1 | » |
| rhombeum (R. Br.) | » | 75 |
| spectabilis | 1 | » |
| **Clematis** florida (Th.), flore pleno | 2 | » |
| insulensis | 2 à 3 | » |
| japonica (Thunb.) | 1 | 50 |
| **Clerodendron** splendens (Hugel). | 2 à 4 | » |
| **Cobæa** scandens (Cav.) | » | 50 |
| stipularis (Hort.) | » | 75 |
| * **Columnea** scandens. | 1 | » |
| * **Combretum** Afzeli (Don.) | 4 à 8 | » |
| * macrophyllum (Roxb.). | 6 | » |
| * purpureum | 3 à 8 | » |
| **Eccremocarpus** scaber (R. P.). | 1 | » |
| * **Echites** purpur a. | 1 | 50 |
| * picta. | 1 à 5 | » |
| * **Figus** repens (Roxb.). | » | 75 |
| * **Gardenia** Scherbourniœ | 3 | » |
| * **Gloriosa** superba (W.). | 1 à 3 | » |
| **Glycine** brachyphylla? Brachybotrya? | 2 | » |
| chinensis coccinea | 3 | » |
| **Hardenbergia** monophylla (Bth.) Glycine bimaculata (Hort.) | 1 | » |
| Comptoniana (Bth.) | 1 | » |
| macrophylla (Renth.). | 2 | » |
| ovata (Benth.) | 2 | » |
| **Hibertia** crenata (Andr.), *H. grossulariæfolia* (Satisb.) | 2 | » |
| * **Ipomea** Horsfalliæ (Hook.) | 2 à 4 | » |
| * Leari | 1 | 50 |
| mexicana. | 1 | » |
| rubra cœrulea. | 1 | » |
| Selloi | 1 | » |
| species de la Chine. | 5 | » |
| Schuttleworthii? *à feuilles palmées et fleurs en bouquets* | 10 | » |
| * **Jasminum** Azoricum | 1 | » |
| grandiflorum | 1 à 3 | » |
| heterophyllum (Wall.) | 1 | 50 |
| nepalense (Spr.). | 1 | 50 |
| * Sambac fl. plena. | 1 à 3 | » |
| Wallichianum (Lindl.) | 1 | 50 |
| **Kennedya** Marryatiaua (Lindl.). | 1 | » |
| glabrata | 1 | » |
| **OBLONGATA** (Lem.). *Kennedya Baumanii* | 1 | » |
| prostrata (R. B.). Glycine coccin. (C.) | 1 | 50 |
| rubicunda (Vent.) | 1 | » |
| species de la nouvelle Hollande | 3 | » |

| La pièce. | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Kennedya** splendens (Nob.) | 2 | » |
| spectabilis | 2 | » |
| **Lathyrus** spec. de Boliva | 5 | » |
| **Lnmalia** laurifolia | 2 | » |
| **Lonicera** japonica | 1 | » |
| **Lophospermum** scandens (B. M.), *L. erubescens* (Don.) | 1 | » |
| Hendersoni | 3 | » |
| atrosanguineum (Zucc.). *Rodochiton volubile* (Zucc.) | 1 | » |
| **Mandevillea** suavelens | 1 à 3 | » |
| * **Manettia** bicolor | 1 | » |
| cordifolia (Mart.) | 1 | » |
| splendens | 3 | » |
| **Maurandia** Barckleyana (Tot. Mag.). | » | 50 |
| Laccayana | 1 | » |
| purpurea grandiflora | 1 | 50 |
| species de la Chine N° 1 | 5 | » |
| » » N° 2 | 6 | » |
| **Medeola** asparagoides (L.). *Myrsiphyllum asparagoides* (Willd.). | 1 | 50 |
| **Micania** senceiodes | 1 | » |
| **Mimosa** prostrata | 2 | » |
| * **Morinda** odorata? | 2 | » |
| **Oxylobium** cordifolium | 1 à 2 | » |
| **Passiflora** edulis (Sims.). | 1 | 50 |
| cœrulea (L.) | 1 | 50 |
| * Herbertiana (Ker.) | 1 | 50 |
| * holosericea | 1 | 50 |
| * Kermesina (L. et O.) | 1 | » |
| * Lemicheziana | 1 | 50 |
| * linearis. | 1 à 2 | » |
| longipedunculata? | 2 | » |
| * Loudonia (Baum.) | 1 | » |
| Mauritiana | 1 | 50 |
| * Neillii | 1 | 50 |
| * palmata (Ledd.) | » | » |
| * Princeps (Lodd.) | 1 | 50 |
| * racemosa | 1 | 50 |
| * quadrangularis (Linn.). | 2 | » |
| suberosa | 1 | » |
| **Phaseolus** Caracalla (Linn.) | 2 | » |
| **Philibertia** grandiflora | 1 | » |
| **Physianthus** undulatus (Hort.). | 2 | » |
| * **Piper** magnoliœfolium | 2 | 50 |
| * nigrum. | 1 | 50 |
| * **Pothos** undulata | 5 | » |
| * **Pteris** flexuosa | 2 à 3 | » |
| **Rhodochiton** volubile | 1 | » |
| **Rosa** Banksiana alba plena | 2 | » |
| grandiflora alba plena. | 2 | » |
| lutea plena. | 1 | 50 |
| pallida. | 1 | » |
| plena | 1 | » |
| Roi des Banks. | 1 | » |
| * **Rubus** japonicus | 2 | » |
| molucanus (Linn.) | 2 | » |
| **Seriana** velutina. | 3 | » |
| **Sollya** heterophylla (Lindl.). | 3 | » |
| salicifolia. | 1 | 50 |

| La pièce. | fr. c. |
|---|---|
| * **Stigmatophyllum** aristatum (Liav.) | 2 » |
| **Tacsonia** molissima | 3 » |
| **Tamus** Elephantipes | 4 à 60 » |
| **Thunbergia** alata | 1 » |
| aurantiaca | 1 » |
| chrysops | 2 à 3 » |
| coccinea (Wallich.) | 1 50 |
| Freyeri | 1 » |
| grandiflora (Roxb.) | 1 50 |
| Hawteyneana (Wall.) | 2 » |
| species nova | 3 » |
| **Tropæolum** lobianum | 1 50 |
| minus (L.), flore pleno | 1 50 |
| **Tropæolum** pentaphyllum (Lam.). Chymocarpum pentaphll. (Don.) | » 75 |
| tricolorum (Sweet.) | 1 à 4 » |
| **Tweedia** coccinea | 1 50 |
| cœrulea (Sweet.) | 1 » |
| **ZYCHIA BAUMANNI** (Lem.) | 2 » |
| floribunda | 6 à 12 » |
| rotundifolia | 10 » |
| *Une collection de 15 espèces, à mon choix* | 12 » |
| *Une collection de 20 espèces, à mon choix* | 25 » |

# OIGNONS ET FLEURS DISPONIBLES.

Les expéditions commenceront à la mi-Août.

*Les prix précédés d'un* p *sont pour la pièce ; ceux précédés de* %, *au cent ; on ne délivrera pas moins de* 25 *pièces de ces derniers, sans une augmentation de* 6 % *du prix marqué.*

NB. *On fera suivre en remboursement le montant de toute commission qui ne dépassera pas* 100 *fr., afin d'éviter les frais d'encaissement.*

*Les espèces marquées d'un * peuvent être expédiées depuis la fin d'Août jusqu'au commencement de Mai, les temps froids exceptés ; celles non marquées, du mois d'Août à la fin de Novembre.*

*Die Preise welchen ein* p *vorangeht, sind für das Stück, und diejenigen welchen* % *vorangeht, für das Hundert. Weniger als* 25 *werden nur mit einer Erhöhung von* 6 % *auf den angegebenen Preis abgegeben werden.*

*Um Incassospesen zu vermeiden, wird der Betrag von jeder Bestellung die sich nicht über* 100 *Fr. beläuft nachgenommen.*

*Die mit * bezeichneten Sorten können vom Ende August bis Anfangs Mai, kalte Witterung ausgenommen, versendet werden, die ohne dieses Zeichen von Anfangs August bis Ende November.*

| | fr. c. |
|---|---|
| * **Aletris** capensis, *Weltheima capen.* p. | 1 » |
| * **Alstrœmeria** aurantiaca | 1 » |
| * aurea | 1 » |
| * chilensis *en plusieurs nuances. Mise en pleine terre pendant l'été, dans une bonne exposition, cette charmante nouveauté fait un effet merveilleux* p. | 1 » |
| * hirtella | 2 » |
| * pelegrina | » 75 |
| * psitacina | » 50 |
| * tricolor | 2 » |
| * **Amaryllis** advena | 2 » |
| * æquestris | 2 » |
| * fulva | 2 » |
| * atamasco minor | 1 » |
| * Belladonna | 1 » |
| * blanda | 2 » |
| candida | 1 » |
| * coccinea | 3 » |
| * crispa | 1 » |
| * Fauthergillii | 2 » |
| * formossissima | » 50 |
| * gravini | 3 » |
| * **Amaryllis** Johnsoni | 2 » |
| * longifolia | 3 » |
| * lutea | 2 » |
| * regine | 3 » |
| * psitacina | 2 » |
| * rutila | 2 à 3 » |
| * species nov. N° 1 du Brésil | 8 » |
| » N° 2 » | 8 » |
| » N° 3 » | 10 » |
| » N° 30 » | 8 » |
| uudulata volota | 4 » |
| * purpurea | 3 » |
| * Verauxii | 5 » |
| * vittata | 2 50 |
| **Anemone** coronaria (DC.). *Doubles mélangées, dans les meilleures variétés* % | 10 » |
| *Simples mélangées, dans les meilleures variétés* % | 9 » |
| hortensis (R. M.). *Doubles mélangés, dans les plus belles variétés.* % | 10 » |
| *Simples mélangés, dans les meilleures variétés* % | 8 » |
| *Simples mélangés, second choix* | 9 » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Anem.** Semperflorens, ou A. de la Chine | 10 | » |
| **Arum** dracunculus . . . . . . . p. | 1 | » |
| * **Boophona** ciliaris (Herb.) . . . . | 6 | » |
| **Bulbocodium** vernum . . . . °/₀ | 6 | » |
| * **Calostema** Cunninghami (Ast.) . . | 10 | » |
| **Clivea** nobilis . . . . . . . . . . . | 1 50 à 10 | |
| * **Coburgia** flava . . . . . . . . . p. | 3 | » |
| **Colchicum** autumnale (W.) . . . . | » | 30 |
| flore pleno. . . . . . | » | 50 |
| **Cooperia** Drumondi (Hook.). . . . | 3 | » |
| latifolia?. . . . . . . . . . . . . | 4 | » |
| **Crinum** amabile (Spr.). . . . . . . | 4 | » |
| * americanum . . . . . . . . . . . | 3 a 10 | » |
| * aquaticum *nouveau* . . . . . . . | 6 | » |
| * bracteatum (Willd.). . . . . . . . | 10 | » |
| * Caribæum (B. M.) . . . . . . . | 8 | » |
| * caladinum? . . . . . . . . . . | 5 | » |
| * erubescens?. . . . . . . . . . | 3 | » |
| * latifolium. . . . . . . . . . . | 3 | » |
| * strictum . . . . . . . . . . . | 4 | » |
| **Crocus** sativus . . . . . . . . . °/₀ | 3 | » |
| vernus (W.). *Une collection de* 100 *pièces en* 6 *variétés, avec noms.* °/₀ | 5 | » |
| *Une collection mélangée*. . . . . . | 2 | » |
| * **Cyclamen** Africanum, *nouveau* . . | 4 à 12 | » |
| * Coum . . . . . . . . . . . . . | 1 à 2 | » |
| * Europæum . . . . . . . . . . . | 50 à 75 | |
| * album . . . . . . . . . . . . . | 1 50 à 2 f. | |
| * persicum . . . . . . . . . . . . | 50 c. à fr. 1 50 | |
| * Neapolitanum . . . . . . . . . . | 1 à 2 | » |
| * **Cyrtanthus** spiralis (Burch.) . . . | 3 | » |
| **Eucomis** nana (Ait.) . . . . . . . . | 1 à 2 | » |
| * **Frittilaria** imperialis (W.) . . . . | » | 50 |
| grand Juvel von Haarlim . . . p. | 20 | » |
| Kroon op kroon . . . . . . . p. | 30 | » |
| Lordmajor . . . . . . . . . . p. | 30 | » |
| marquis de Geroth . . . . . . p. | 30 | » |
| Schlacht Schwert . . . . . . p. | 30 | » |
| William Rex . . . . . . . . p. | » | 50 |
| Meleagris (W.). *Mélange* . . . . °/₀ | 15 | » |
| Persica . . . . . . . . . . . . p. | » | 75 |
| * **Gethyllis** spec. nova. . . . . . . | 10 | » |
| **Gladiolus** Alexandrinus . . . . . p. | 1 | 50 |
| Bizantinus . . . . . . . . . . . . p. | » | 75 |
| Cardinalis . . . . . . . . . . . . p. | 1 | » |
| Emicans . . . . . . . . . . . . p. | » | 50 |
| Ernest Maltravers . . . . . . . . p. | 5 | » |
| floribundus. . . . . . . . . . . p. | 1 | » |
| *les* 12. . . . . . . . . . . . . p. | 4 | » |
| formosissima . . . . . . . . . . p. | 5 | » |
| Gandavensis . . . . . . . . . . p. | 2 | » |
| Geppini . . . . . . . . . . . . p. | 1 | » |
| imperialis . . . . . . . . . . . p. | 3 | » |
| Lord John Russel . . . . . . . . p. | 5 | » |
| Lord Palmerston. . . . . . . . . p. | 4 | » |
| Merianus. . . . . . . . . . . . p. | 2 | » |
| Prince Albert . . . . . . . . . . p. | 4 | » |
| psitacinus . . . . . . . . . . . p. | 1 | » |
| *les* 12 *bulbes* . . . . . . . . . p. | 1 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Gladiolus** pulcherrimus . . . . . . p. | 1 | » |
| ramosus . . . . . . . . . . . . p. | 3 | » |
| Neipergi *rouge éblouissant*. . . p. | 10 | » |
| splendens . . . . . . . . . . . p. | 8 | » |
| tigrinus . . . . . . . . . . . p. | » | » |
| * **Hippeastrum** stylosum (Herb.) . p. | 1 à 10 | » |
| * **Hoemanthus** ciliaris . . . . . p. | 6 | » |
| coccineus . . . . . . . . . . . p. | 2 à 3 | » |
| * Pubescens . . . . . . . . . . p. | 3 | » |
| * tigrinus. . . . . . . . . . . . p. | 3 | » |
| **Hyacinthus** orientalis (W.). *Une collection de* 25 *pièces, en* 25 *des plus belles variétés doubles et nouvelles, avec noms* . . . . . . . . . | 25 | |
| *Une collection de* 25 *pièces, en* 25 *variétés assorties avec noms, premier choix* . . . . . . . . . . . . | 20 | » |
| *Une collection de* 25 *variétés*, 2[e] *choix, assortis avec noms* . . . . . . | 12 | » |
| *NB.* Ces assortimens peuvent aussi être donnés par 12, avec l'augmentation de 6 p. ₀/⁰ du prix coté. | | |
| *Une collection de* 50 *pièces, assorties dans les diverses couleurs, sans noms.* | 20 | » |
| *Une collection de* 50 *pièces mélange* . | 15 | » |
| Belgicus . . . . . . . . . . . . p. | » | 25 |
| Botrioides . . . . . . . . . . . p. | » | 20 |
| rosea . . . . . . . . . . . . . p. | » | » |
| monstrosus. . . . . . . . . . . p. | 15 | » |
| muscari major . . . . . . . . . p. | » | 40 |
| plumosus. . . . . . . . . . . . p. | » | 25 |
| **Iris** persica (W.), odorante . . . . p. | » | 20 |
| susiana . . . . . . . . . . . . p. | 1 | » |
| xyphioides (J. Anglica). *Dans diverses couleurs, assorties avec noms*. . p. | » | 25 |
| *En mélange* . . . . . . . . . °/₀ | 10 | » |
| xyphium (J. Hispanica). *En diverses couleurs, assorties avec noms* . °/₀ | 6 | » |
| *En mélange* . . . . . . . . °/₀ | 6 | » |
| **Ixia** crocata . . . . . . . . . . p. | » | 50 |
| Fenestralis . . . . . . . . . . p | » | 50 |
| Hyalina . . . . . . . . . . . . p. | » | 50 |
| leucantha . . . . . . . . . . . p. | » | 50 |
| lilacina . . . . . . . . . . . . p. | » | 50 |
| lineata. . . . . . . . . . . . . p. | 1 | » |
| longiflora . . . . . . . . . . . p. | » | 50 |
| miniata . . . . . . . . . . . . p. | » | 50 |
| patens. . . . . . . . . . . . . p. | » | 50 |
| pavonia . . . . . . . . . . . . p. | » | 50 |
| squalens . . . . . . . . . . . p. | » | 50 |
| *En mélange*. . . . . . . . . . . | 15 | » |
| * **Lachnalia** pedula . . . . . . . p. | 1 | 50 |
| * tricolor . . . . . . . . . . . p. | 1 | 50 |
| * **Lapeyrousia** grandiflora . . . p. | » | 50 |
| * **Lilium** aurantiacum . . . . . . . p. | 1 | 50 |
| * bulbiferum (L.) . . . . . . . . p. | 1 | 50 |
| foliis striatis . . . . . . . . p. | 5 | » |
| * camtschaticum. . . . . . . . . p. | 1 | 50 |
| * canadense (L.). . . . . . . . . p. | 1 | » |
| 100 *pièces* . . . . . . . . . . | 20 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| * **Lilium** candidum (L.) . . . . . . p. | » | 50 |
| * flore pleno . . . . . . . . . p. | 1 | » |
| * fol. varieg. alba . . . . . . p. | 1 | 50 |
| * concolor . . . . . . . . . . p. | 1 | 50 |
| * excelsum . . . . . . . . . . p. | 15 | » |
| * lancifolium album (V. Sieb.) . . p. | 4 à 8 | » |
| roseum . . . . . . . . . . . | 3 à 5 | » |
| * Martagnon (L.). . . . . . . . . p. | » | 50 |
| * pomponium (L.) . . . . . . . . p. | 1 | » |
| * luteum. . . . . . . . . . . p. | 1 | » |
| * tigrinum (Ker.) . . . . . . . p. | 1 | 50 |
| * umbellatum . . . . . . . . . . | 3 | 50 |
| * venustum. . . . . . . . . . . | 4 | » |
| **Narcisses à bouquets jaunes**, Soleil d'or . . . . . . . . . . | » | 40 |
| **A BOUQUETS AVEC CITRON ET BLANC**. Grand-Primo . . p. | » | 50 |
| Staaten general . . . . . . . . p. | » | 40 |
| **DOUBLES**, Incomparable . . . p. | » | 15 |
| Orange phœnix . . . . . . . . p. | » | 25 |
| Van Sion . . . . . . . . . . p. | » | 15 |
| mélange . . . . . . . . . . %/o | 8 | » |
| *de Constantinople*, les meilleures pour forcer. . . . . . . . %/o | 20 | » |
| Jonquilla fl. simplex . . . . . %/o | 12 | » |
| flore pleno . . . . . . . . . p. | » | 40 |
| **Ranunculus**. 25 *Renoncules en 25 variétés diverses, doubles, assorties avec noms* . . . . . . . . %/o | 6 | » |
| *Mélange double, premier choix* . %/o | 8 | » |
| » *second choix* . %/o | 5 | » |
| Pivoine rouge. . . . . . . . %/o | 8 | » |
| Turban d'or . . . . . . . . . p. | » | 20 |
| **Scilla** amina. . . . . . . . . . p. | 1 | 25 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Scilla** autumnalis (L.) . . . . . . p. | » | 50 |
| bifolia (L.) . . . . . . . . . %/o | 3 | » |
| campanulata . . . . . . . . . p. | » | 50 |
| alba. . . . . . . . . . . . p. | » | 75 |
| hyacinthoides (Lin,) . . . . . . p. | 1 | 50 |
| præcops . . . . . . . . . . . p. | 1 | » |
| peruviana . . . . . . . . . . p. | 2 | » |
| * **Spreckilia** glauca. . . . . . . p. | 5 | » |
| **Tigridia** pavonia. . . . . . . . %/o | 8 | » |
| **Tulipes.** *Une collection de 50 pièces en 25 variétés simples, premier choix* . . . . . . . . . . %/o | 13 | » |
| Tulipes doubles *mélangées, second choix* . . . . . . . . . . . %/o | 8 | » |
| double soleil d'or . . . . . p. | » | 30 |
| Duc de Berlin. . . . . . . . . %/o | 10 | » |
| Duc van Toll, *pour forcer*. . . %/o | 10 | » |
| *doubles pour forcer*. . . . . . %/o | 15 | » |
| Tulipee simples *à fond blanc, premier choix* . . . . . . . . . . . %/o | 6 | » |
| Tulipes simples *à fond jaune, premier choix* . . . . . . . . . . . %/o | 6 | » |
| Tulipes simples *mélangées dans les meilleures variétés*. . . . . . . %/o | 5 | » |
| Tulipes monstrueuses ou Perroquets. %/o | 15 | » |
| caffé . . . . . . . . . . . p. | » | » |
| panachées . . . . . . . . . p. | » | 20 |
| jaunes. . . . . . . . . . . p. | » | 20 |
| Tulipa Stenopetala, *tulipes chinoises à pédales pointues*. . . . . . . p. | » | 25 |
| **Velthimia** capensis. . . . . . . p. | 1 | 50 |
| Carinatus . . . . . . . . . . p. | 3 | » |
| **Zephyranthus** grandiflorus . . . . | 2 | » |
| roseus. . . . . . . . . . . . | 3 | » |

---

## GRAINES.

### Graines de Giroflées d'Erfurth.

30 Variétés très-distinctes.

*Le beau succès qu'ont obtenu les amateurs à qui j'ai fourni de ces graines les années précédentes, m'a engagé à les recommander spécialement; je les tire directement d'Erfurth.*

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Le paquet de 20 variétés assorties . . . | 5 | » |

### Graines de plantes annuelles d'ornement.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Une collection de 75 espèces et variétés, à mon choix . . . . . . . . . . | 10 | » |
| Une collection de 50 espèces et variétés | 8 | » |

### Graines de plantes vivaces de pleine terre.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Une collection de 50 espèces, à mon choix. . . . . . . . . . . . . | 10 | » |

### Graines forestières.

### Graines fourragères et de grandes culture.

### Graines de plantes de serre chaude et d'orangerie.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Une collection de 50 espèces et variétés à mon choix . . . . . . . . . . | 10 | » |

### Graines d'arbres et d'arbustes d'ornement de pleine terre.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Une collection de 50 espèces, à mon choix . . . . . . . . . . . . . | 12 | 50 |

## TERRES DIVERSES.

*Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre, périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère : par conséquent, j'offre, à raison de 1 fr. 50 c., le double décalitre (25 kil.) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez moi de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.*

*Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher bieten wir den doppelten Dekaliter (etwa 25 Kilog) geruhter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe von 12 bis 15 Centimeter im Durchmesser füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei mir auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben.*



MULHOUSE, IMPRIMERIE DE P. BARET.

## JARDINIERS.

Je me charge gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

## CONSTRUCTION DE JARDINS.

J'entreprends la plantation de jardins et des tracés de jardin, et tiens à la disposition des propriétaires, des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

---

## GÆRTNER.

Ich befasse mich unentgeldlich mit Besetzung von Gærtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man mir die besondere Verwendung wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

## GARTEN-ANLAGEN.

Ich übernehme auch Anlagen und Anpflanzungen von Gærten aller Art, und halte zu diesem Zwecke der Sache gewachsene Gærtner, zur Verfügung der Herren Eigenthümer.

---

Outre ces articles, on peut se procurer dans mon établissement des **arbres fruitiers**, **d'alignement**, **arbres et arbustes d'agrément de pleine terre**, **plantes potagères**, **plantes vivaces de pleine terre**, **graines de grande culture, potagères**, etc., enfin tout ce qui a rapport à l'horticulture, outils, livres, etc. *Voyez le Catalogue N° 1. 1848.*

---

Ausser oben angegebenen Artikeln kann man bei mir in schœner Auswahl haben **Obst-, Allee- und Zierbäume; Gesträucher aller Art für's freie Land, perennirende Pflanzen, Küchenkräuter und Saamen aller Art.** *Man sehe den Catalogue N° 1. 1848.*

